



Teupantol[®]

Pomada 50mg/g

MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE



Teupantol®

dexpantenol

APRESENTAÇÕES

Pomada 50mg/g

Embalagens contendo 1 bisnaga com 15g.
Embalagens contendo 1 bisnaga com 30g
Embalagens contendo 1 bisnaga com 45g
Embalagens contendo 1 bisnaga com 60g
Embalagens contendo 1 bisnaga com 60g

Embalagens hospitalares contendo 50 e 100 bisnagas com 15g.
Embalagens hospitalares contendo 50 e 100 bisnagas com 30g.
Embalagens hospitalares contendo 50 e 100 bisnagas com 45g.
Embalagens hospitalares contendo 50 e 100 bisnagas com 60g.
Embalagens hospitalares contendo 50 e 100 bisnagas com 90g.

USO TÓPICO / EXTERNO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama da pomada contém:

dexpantenol (vitamina B ₅).....	50mg
Excipiente q.s.p.....	1g
Excipientes: lanolina anidra, petrolato branco, oleato de sorbitana, óleo de amêndoas doce, petrolato líquido, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol e água de osmose reversa.	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado para a cicatrização de feridas, escaras, fissuras de pele e mucosas, bem como de rachaduras.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Teupantol® pomada contém como princípio ativo o dexpantenol associado a uma base de elevado teor oleoso.

O dexpantenol, substância ativa de Teupantol® pomada, é rapidamente transformado nas células da pele e mucosa em ácido pantotênico. O ácido pantotênico é um componente da coenzima A (CoA), necessária para os processos de regeneração e cicatrização da pele e das mucosas. O ácido pantotênico estimula a multiplicação das células basais que realizarão a

epitelização da epiderme e dos fibroblastos que promovem a síntese do colágeno, constituinte fundamental da derme.

3. CONTRAINDICAÇÕES

Teupantol® pomada é contraindicado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida ao dexpantenol ou a qualquer um dos componentes do produto.

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Evite o contato de Teupantol® pomada com os olhos.

Não existem relatos sobre precauções especiais para o uso de Teupantol® pomada.

Não existem restrições ao uso de Teupantol® pomada em pacientes idosos e em crianças.

Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não existem relatos de interação de dexpantenol pomada com outras substâncias.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Conservar a bisnaga fechada.

DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA UMIDADE.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Teupantol® pomada oleosa, translúcida, brilhante, homogênea, isenta de partículas estranhas, odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Teupantol® pomada deve ser aplicado diretamente sobre a pele limpa.

Aplicar uma camada de Teupantol® pomada 2 a 3 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Não existem relatos sobre precauções especiais necessárias para o uso de Teupantol® pomada. Entretanto, podem ocorrer efeitos colaterais indesejáveis não previstos e dependentes da sensibilidade individual. Neste caso suspenda o uso do produto e informe seu médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Reações rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

– NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. SUPERDOSE

Em caso de ingestão accidental ou proposital de quantidade excessiva de Teupantol® pomada, as seguintes medidas de desintoxicação podem ser consideradas:

- indução de vômito;
- lavagem gástrica.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. nº 1.0370.

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva
CRF-GO nº 2.659

LABORATÓRIO *TEUTO BRASILEIRO S/A.*****

CNPJ – 17.159.229/0001 -76
VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA
CEP 75132-140 – Anápolis – GO
Indústria Brasileira



Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.