

**Gastromax**

hidróxido de alumínio – DCB: 04694

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Nome comercial:** Gastromax

**Nome genérico:** hidróxido de alumínio (DCB 04694)

**APRESENTAÇÕES**

**GASTROMAX** comprimidos – 300mg – Embalagem contendo 200 comprimidos.

**USO ORAL**

**USO ADULTO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido de **GASTROMAX** contém:

hidróxido de alumínio ..... 300 mg

Excipientes q.s.p. ..... 1 comprimido

(água purificada, sacarina sódica, amido, ciclamato de sódio, amidoglicolato de sódio, aroma de menta, talco, celulose microcristalina e laurilsulfato de sódio).

**II - INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

**1. INDICAÇÕES**

**GASTROMAX** é indicado para acidez estomacal, azia (queimação), desconforto estomacal, dor de estômago, dispepsia (má digestão).

**2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

O hidróxido de alumínio reage quimicamente para neutralizar ou tamponar quantidades de ácidos estomacais. Esta ação resulta em um aumento no valor do pH do conteúdo estomacal, e, por consequência, há um alívio nos sintomas de hiperacidez. Propõem-se que o mecanismo de ação dos antiácidos inclui: aumento da secreção de bicarbonato de sódio e de muco, restituição da mucosa gastrintestinal, aumento da produção e liberação de prostaglandina pela mesma e manutenção da microcirculação.

**3. CONTRAINDICAÇÕES**

O hidróxido de alumínio não deve ser administrado em pacientes com insuficiência renal ou portadores de uropatia obstrutiva. O uso de antiácido contendo alumínio é contraindicado em pacientes com sintomas de apendicite, uma vez que estes medicamentos podem aumentar o risco de perfuração em virtude do efeito constipante.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Pode ocorrer hiperaluminemias em pacientes com insuficiência renal crônica. O hidróxido de alumínio na vigência de dietas hipofosforadas pode provocar uma deficiência de fósforo.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

O hidróxido de alumínio não deve ser administrado juntamente às tetraciclinas, devido à formação de um complexo tornando-as inabsorvíveis. O hidróxido de alumínio não deve ser administrado concomitantemente com antibióticos, benzodiazepínicos, fenotiazinas, diflunisal, digoxina ou cetoconazol, quinolonas, propanolol, atenolol, captopril, ranitidina ou ácido acetilsalicílico por diminuir a absorção destes medicamentos. O uso da levodopa aumenta a absorção desta droga. O hidróxido de alumínio pode reduzir o efeito terapêutico de sais de lítio.

**6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO**

**GASTROMAX** deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 a 30°C), protegido da luz e da umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**GASTROMAX** é um comprimido circular de coloração branca e sabor menta.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**7. POSOLOGIA E MODO DE USAR**

Úlcera duodenal: Ingerir 2 a 4 comprimidos, via oral, com intervalos de 2 a 4 horas, cerca de uma hora após cada refeição.

Alívio da azia e queimação: Ingerir 2 a 4 comprimidos, via oral, cerca de uma hora após as refeições.

**8. REAÇÕES ADVERSAS**

Antiácidos contendo alumínio podem causar constipação intestinal. O uso prolongado de hidróxido de alumínio por indivíduos ingerindo uma dieta pobre em fosfato pode provocar osteomalácia e miopatia proximal. Intolerância à ação adstringente do hidróxido de alumínio pode se revelar por náuseas e vômitos, assim como por constipação intestinal.



**Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.**

**9. SUPERDOSE**

No caso de superdosagem, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**III - DIZERES LEGAIS**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS 1.1560.0048

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122

**Fabricado por:**

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.

Av. das Indústrias, 3651 – Bicas

CEP: 33040-130 – Santa Luzia / MG

CNPJ: 17.562.075/0003-20 – Indústria Brasileira



**Registrado por:**

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.

Rod. BR 153 Km 5,5 – Jardim Guanabara

CEP: 74675-090 – Goiânia / GO

CNPJ: 17.562.075/0001-69 – Indústria Brasileira

**CAC: 0800 707 1212**