

HYPOT®
cloreto de potássio
100 mg/mL (10%) e 191 mg/mL (19,1%)
Solução Injetável



APRESENTAÇÕES

Solução injetável, estéril e apirrogênica.

Hypot® 10%

Caixa com 200 ampolas plásticas de 10 mL
Caixa com 100 ampolas plásticas de 10 mL
Caixa com 100 ampolas de vidro incolor de 10 mL

Hypot® 19,1%

Caixa com 200 ampolas plásticas de 10 mL
Caixa com 100 ampolas plásticas de 10 mL
Caixa com 100 ampolas de vidro incolor de 20 mL
Caixa com 100 ampolas de vidro incolor de 10 mL

USO INTRAVENOSO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Hypot® 10%

Cada mL da solução injetável contém:

cloreto de potássio.....	100 mg
água para injetáveis q.s.p.....	1 mL
Conteúdo eletrolítico	
potássio (K ⁺)	1,34 mEq/mL
cloreto (Cl ⁻)	1,34 mEq/mL

Hypot® 19,1%

Cada mL da solução injetável contém:

cloreto de potássio.....	191 mg
água para injetáveis q.s.p.....	1 mL
Conteúdo eletrolítico	
potássio (K ⁺)	2,559 mEq/mL
cloreto (Cl ⁻)	2,559 mEq/mL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1- PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Hypot® é indicado para tratamento de hipopotassemia e intoxicações digitais.

2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Hypot® promove a reposição dos íons cloreto e potássio ao organismo, necessários a condução dos impulsos nervosos e contração muscular adequada.

3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use **Hypot®** se você já teve alguma reação alérgica a qualquer substância da formulação ou se estiver fazendo uso de diuréticos. O cloreto de potássio também não deve ser utilizado em casos de:

- Insuficiência renal grave;
- Hipercalemia;
- Desidratação aguda;
- Choque térmico;
- Politraumatismo;
- Doença de Addison.

4- O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar os seguintes cuidados antes de administrar este medicamento:

- verificar o prazo de validade;
- não utilizá-lo se o recipiente estiver violado e se a solução apresentar turvação;
- descartar imediatamente o volume não usado após abertura da ampola;

Como medida de precaução deve-se levar em consideração a relação risco-benefício quando existirem os seguintes problemas médicos: acidose metabólica com oligúria, azotemia, bloqueio cardíaco grave ou completo, desidratação aguda, diarreia prolongada ou grave, doença de Addison não tratada, hipoadrenalismo, insuficiência renal crônica, motilidade gastrointestinal anormal, obstrução gastrointestinal, oligúria, problemas médicos associados com traumas, sensibilidade ao potássio, ulceração gastrointestinal. Não se recomenda o uso de cloreto de potássio em pacientes em uso de digitálicos com bloqueio cardíaco grave ou completo.

O cloreto de potássio pode interagir com diversos medicamentos causando os seguintes efeitos:

- pode intensificar os efeitos antiarrítmicos da quinidina;
- adrenocorticóides podem diminuir os efeitos do cloreto de potássio;
- anticolinérgicos ou outros fármacos com atividade anticolinérgica podem aumentar a gravidade das lesões gastrointestinais produzidas apenas pelo cloreto de potássio;
- antiinflamatórios não-esteroidais podem aumentar o risco de efeitos colaterais gastrointestinais e causar hiperpotassemia;
- sais de cálcio podem precipitar arritmias cardíacas;
- ciclosporina pode causar hiperpotassemia devido ao hipoaldosteronismo;

- diuréticos tiazídicos podem aumentar o risco de hipopotassemia;
- heparina aumenta o risco de hemorragia gastrointestinal;
- uso crônico ou abuso de laxativos pode reduzir as concentrações séricas de potássio;
- substitutos de sal ou inibidores da ECA (ex.: captopril, enalapril, lisinopril) podem causar hipopotassemia;
- sangue oriundo de bancos de sangue, diuréticos poupadores de potássio, leite com baixo teor salino e outros fármacos contendo potássio promovem acúmulo de potássio com possível hiperpotassemia resultante, sobretudo em pacientes com insuficiência renal.

Uso na gravidez e lactação

Hypot® somente deve ser utilizado durante o primeiro trimestre de gravidez e no período de amamentação, se isto for justificado pelos benefícios terapêuticos previstos.

Uso em pacientes idosos

Hypot® poderá ser utilizado por pacientes acima de 65 anos, desde que observadas as precauções relacionadas ao uso do produto.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar o **Hypot®** em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Solução límpida, incolor e isenta de partículas em suspensão.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

POSOLOGIA

Adultos

- 20 a 40 mEq (1,49g a 2,89g) por dia para prevenir depleção de potássio.


- 40 a 100 mEq (2,89g a 7,55g) por dia como reposição em 3 ou 4 doses fracionadas.

Crianças


- 1 a 3 mEq (75,5mg a 226,5mg) por Kg corporal por dia, em várias doses fracionadas.

MODO DE USAR



Instruções para a abertura da ampola plástica de Hypot®




Segure a ampola na posição vertical e dê leves batidas na parte superior da ampola. Dessa forma, você irá remover a porção de líquido localizada em seu colo. Caso fique retida uma pequena quantidade de líquido, isto não prejudicará o volume a ser utilizado (figura 1).




Com a ampola na posição vertical, dobre o gargalo para frente (45°) (figura 2) e para trás (45°) (figura 3).




Segure firmemente o *twist-off* (aletas laterais) (figura 4) e gire-o no sentido anti-horário (figura 5), até abrir completamente a ampola plástica.



Insira a seringa a ser utilizada na abertura da ampola plástica (figura 6).




Inverta a ampola plástica e retire o seu conteúdo, puxando o êmbolo da seringa adequadamente (figura 7). É comum permanecer um discreto volume de líquido no interior da ampola.



Quando esvaziada, remova a ampola da seringa, mantendo o seu êmbolo puxado (figura 8).

Instruções para a abertura da ampola de vidro de Hypot®



1. Fazer o líquido eventualmente contido na parte superior da ampola passar para a parte inferior por meio de movimentos circulares ou pequenos golpes de dedo.



2. Segurando firmemente o corpo da ampola numa mão, aplicar com a outra uma força sobre a parte superior, em direção contrária ao ponto (ou seja, para baixo), até o rompimento do gargalo da ampola.

3. Após aberta a ampola, proceda da mesma forma como na ampola plástica para retirar a solução da mesma (figura 6 a 8).

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

7- QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

As seguintes reações podem surgir com o uso de **Hypot®**:

- Hiperpotassemia,
- Hemorragia,
- Ulceração ou perfuração gastrointestinal;
- Irritação do trato alimentar;
- Diarréia, náusea, desconforto abdominal, vômito;
- Exantema.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento,

entrando em contato através do serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

8- O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

As manifestações da administração de uma dosagem maior de cloreto de potássio incluem fraqueza muscular, parestesias, paralisias, queda de pressão, arritmias e parada cardíaca. Aumento nos níveis de potássio no sangue podem se desenvolver de forma rápida e sem sintomas. O tratamento consiste no uso de gliconato de cálcio, glicose e insulina e, quando indicado, bicarbonato de sódio.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

USO RESTRITO A HOSPITAIS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

DIZERES LEGAIS

M.S. 1.0387.0001

Farm. Resp.: Dra. Sinara P. A. Lopes
CRF MG 8993

Hypofarma-Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda
R. Dr. Irineu Marcellini, 303-Ribeirão das Neves – MG
C.N.P.J.: 17.174.657/0001-78
Indústria Brasileira



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 08007045144

COD.: 1209.0117-999 Versão B

