

# **BIOVITA C**

## **Ácido ascórbico 1g**

### **APRESENTAÇÕES**

Comprimidos efervescentes de 1 g.

Embalagem contendo 10 comprimidos efervescentes.

### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

#### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido efervescente 1g contém:

Ácido ascórbico (Vitamina C)..... 1 g

Excipientes qsp..... 1 comprimido efervescente  
(excipientes: ácido tartárico, bicarbonato de sódio, sacarose, corante amarelo de tartrazina, polvaroma de laranja, ciclamato de sódio, carbowax 4000).

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Biovita C é um suplemento vitamínico indicado com auxiliar do sistema imunológico.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Biovita C corrige estados de carência de vitamina C, estimula as defesas orgânicas nas épocas de maior perigo de infecção e supre as necessidades que ocorrem em estados normais (gravidez, amamentação, atividades esportivas, trabalho intenso) e patológicos (doenças infecciosas e estados febris).

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não tome este medicamento se você sofre de cálculos renais ou de deficiência grave do funcionamento dos rins, ou ainda se você possui alergia a qualquer dos componentes da fórmula.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Advertências e Precauções**

Se você é cardíaco ou sofre de pressão alta, deve procurar orientação médica antes de tomar Biovita C, por causa de seu conteúdo de sódio (sal). Se você encontra-se em dieta com restrição de sódio, deve considerar que cada comprimido efervescente de 1g contém 0,347 g de sódio. A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames de laboratório (glicosúria, transaminases, desidrogenase lática, bilirrubina, pesquisa de sangue oculto nas fezes). É necessário interromper o uso deste produto antes desses exames.

**Atenção: Os comprimidos efervescentes de 1g contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido**

**acetilsalicílico.**

#### **Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

Se você é diabético, sofre de hipoglicemia ou faz dieta com restrição de açúcar, procure orientação médica antes de tomar este produto, já que sua fórmula contém sacarose (açúcar). Não existem advertências nem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

**Atenção: os comprimidos efervescentes de 1g contém açúcar (sacarose), portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes.**

#### **Gravidez e amamentação**

Este produto pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação quando houver a necessidade de um maior suprimento de vitamina C. Entretanto, se você está grávida ou amamentando, não tome doses altas, pois a vitamina C atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos**

Alimentos não interferem com os efeitos deste produto. Evite tomar o produto juntamente com bebidas alcoólicas. O uso simultâneo com barbitúricos aumenta a necessidade diária de vitamina C. Este produto, se tomado junto com medicamentos à base de substância desferroxamina, pode potencializar os efeitos tóxicos do ferro no organismo. Salicilatos podem aumentar a eliminação urinária da vitamina C.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **Direção de veículos e operação de máquinas**

Você pode dirigir e lidar com máquinas normalmente durante o tratamento com Biovita C.

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve conservar o produto dentro de sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), protegendo da luz e da umidade. Após a utilização, mantenha o frasco sempre bem fechado.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### **Aspecto físico**

Biovita C Comprimidos Efervescentes de 1g apresentam-se na forma de comprimido redondo e alaranjado.

## **Características organolépticas**

Biovita C Comprimidos Efervescentes de 1g possuem odor característico de laranja e tangerina.

A vitamina C, quando exposta ao ar e à umidade, pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da embalagem.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deverá ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Biovita C Comprimidos Efervescentes 1g: você deve dissolver o comprimido efervescente em um copo de água e aguardar a efervescência. Após o término da mesma, ingerir o produto dissolvido.

### **Posologia**

#### **USO ORAL.**

Biovita C Comprimidos Efervescentes 1 g: 1 comprimido ao dia, ou conforme prescrição médica.

Doses superiores às recomendadas devem ser tomadas somente com indicação médica.

### **Risco de uso por via de administração não recomendada**

Não há estudo dos efeitos de Biovita C administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Os comprimidos Efervescentes não devem ser partidos ou mastigados.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Tome a dose assim que se lembrar, mas não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, este produto pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem

em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Este produto é normalmente bem tolerado. Em algumas pessoas podem ocorrer queixas de perturbações digestivas. Essas perturbações são infreqüentes (ocorrendo entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e de pequena intensidade: azia, diarreia, enjoos, vômitos e também aumento do volume urinário. Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de medicamentos contendo vitamina C pode ocasionar cálculos renais (pedras nos rins).

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de intoxicação por dose excessiva de vitamina C. Se você tiver alguma reação adversa, suspenda o uso do produto e procure assistência médica, caso seja necessário.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.1695.0024

Farmacêutico Responsável: Glauco Fernandes Miranda – CRF/RS 5252

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA.

Rua: Flávio Francisco Bellini, 459

Caxias do Sul – RS CEP: 95098-170

CNPJ: 29.346.301/0001-53

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (54) 4009.3210 - sac@vitamed.com.br  
www.vitamed.com.br

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Data de fabricação e prazo de validade: *vide embalagem.*



**BIOVITA C**  
**Ácido ascórbico 500mg**

**APRESENTAÇÕES**

Comprimidos Mastigáveis de 500mg  
Embalagem contendo frascos com 30 comprimidos mastigáveis.

**USO ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido mastigável 500mg contém:  
Ácido ascórbico (Vitamina C)..... 500 mg  
Excipientes qsp..... 1 comprimido  
(excipientes: manitol, sorbitol, amido de milho, estearato de magnésio, aroma de laranja, aroma de tangerina, corante amarelo nº 6).

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Biovita C é um suplemento vitamínico indicado com auxiliar do sistema imunológico.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Biovita C corrige estados de carência de vitamina C, estimula as defesas orgânicas nas épocas de maior perigo de infecção e supre as necessidades que ocorrem em estados normais (gravidez, amamentação, atividades esportivas, trabalho intenso) e patológicos (doenças infecciosas e estados febris).

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não tome este medicamento se você sofre de cálculos renais ou de deficiência grave do funcionamento dos rins, ou ainda se você possui alergia a qualquer dos componentes da fórmula.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Advertências e Precauções**

A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames de laboratório (glicosúria, transaminases, desidrogenase láctica, bilirrubina, pesquisa de sangue oculto nas fezes). É necessário interromper o uso deste produto antes desses exames.

**Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

Se você é diabético, sofre de hipoglicemias ou faz dieta com restrição de açúcar, procure orientação médica antes de tomar este produto, já que sua fórmula contém sacarose (açúcar). Não existem advertências nem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

**Biovita C comprimidos mastigáveis contém sorbitol, que é melhor tolerado por diabéticos, por ser absorvido mais lentamente pelo trato gastrintestinal, mas no fígado é transformado em frutose e glicose.**

**Gravidez e amamentação**

Este produto pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação quando houver a necessidade de um maior suprimento de vitamina C. Entretanto, se você está grávida ou amamentando, não tome doses altas, pois a vitamina C atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos**  
Alimentos não interferem com os efeitos deste produto. Evite tomar o produto juntamente com bebidas alcoólicas. O uso simultâneo com barbitúricos aumenta a necessidade diária de vitamina C. Este produto, se tomado junto com medicamentos à base de substância desferroxamina, pode potencializar os efeitos tóxicos do ferro no organismo. Salicilatos podem aumentar a eliminação urinária da vitamina C.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Direção de veículos e operação de máquinas**

Você pode dirigir e lidar com máquinas normalmente durante o tratamento com Biovita C.

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve conservar o produto dentro de sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), protegendo da luz e da umidade. Após a utilização, mantenha o frasco sempre bem fechado.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.  
Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto físico**

Biovita C comprimidos mastigáveis apresentam-se na forma de comprimido redondo e alaranjado.

**Características organolépticas**

Biovita C comprimidos mastigáveis possuem odor característico de laranja e tangerina.

A vitamina C, quando exposta ao ar e à umidade, pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da embalagem.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele**

esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

**Todo medicamento deverá ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Biovita C Comprimidos Mastigáveis: dissolva o comprimido mastigável na boca.

### **Posologia**

#### **USO ORAL.**

Biovita C comprimidos Mastigáveis: 1 a 2 comprimidos ao dia, ou conforme prescrição médica.

Doses superiores às recomendadas devem ser tomadas somente com indicação médica.

### **Risco de uso por via de administração não recomendada**

Não há estudo dos efeitos de Biovita C administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Tome a dose assim que se lembrar, mas não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, este produto pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Este produto é normalmente bem tolerado. Em algumas pessoas podem ocorrer queixas de perturbações digestivas. Essas perturbações são infreqüentes (ocorrendo entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e de pequena intensidade: azia, diarreia, enjoo, vômitos e também aumento do volume urinário. Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de medicamentos contendo vitamina C pode ocasionar cálculos renais (pedras nos rins).

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do**

**medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de intoxicação por dose excessiva de vitamina C. Se você tiver alguma reação adversa, suspenda o uso do produto e procure assistência médica, caso seja necessário.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.1695.0024

Farmacêutico Responsável: Glauco Fernandes Miranda – CRF/RS 5252

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA.

Rua: Flávio Francisco Bellini, 459

Caxias do Sul – RS CEP: 95098-170

CNPJ: 29.346.301/0001-53

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (54) 4009.3210 - [sac@vitamed.com.br](mailto:sac@vitamed.com.br)

[www.vitamed.com.br](http://www.vitamed.com.br)

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Data de fabricação e prazo de validade: *vide embalagem.*



## **BIOVITA C** **Ácido ascórbico 200mg/ml**

### **APRESENTAÇÕES**

Gotas

Embalagem contendo um frasco com 30 ml.

### **USO ORAL**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada ml contém:

Ácido ascórbico (Vitamina C)..... 200 mg  
Excipientes qsp..... 1 ml  
(excipientes: sorbitol, hidróxido de sódio, acessulfame de potássio, nipagin, nipazol, aroma de tutti-frutti, aroma de morango e água purificada).

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Biovita C é um suplemento vitamínico indicado com auxiliar do sistema imunológico.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Biovita C corrige estados de carência de vitamina C, estimula as defesas orgânicas nas épocas de maior perigo de infecção e supre as necessidades que ocorrem em estados normais (gravidez, amamentação, atividades esportivas, trabalho intenso) e patológicos (doenças infecciosas e estados febris).

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não tome este medicamento se você sofre de cálculos renais ou de deficiência grave do funcionamento dos rins, ou ainda se você possui alergia a qualquer dos componentes da fórmula.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Advertências e Precauções**

A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames de laboratório (glicosúria, transaminases, desidrogenase lática, bilirrubina, pesquisa de sangue oculto nas fezes). É necessário interromper o uso deste produto antes desses exames.

##### **Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

Se você é diabético, sofre de hipoglicemias ou faz dieta com restrição de açúcar, procure orientação médica antes de tomar este produto, já que sua fórmula contém sacarose (açúcar). Não existem advertências nem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

**Biovita C solução oral contém sorbitol, que é melhor tolerado por diabéticos, por ser absorvido mais lentamente pelo trato gastrintestinal, mas no fígado é transformado em frutose e glicose.**

##### **Gravidez e amamentação**

Este produto pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação quando houver a necessidade de um maior suprimento de vitamina C. Entretanto, se você está grávida ou amamentando, não tome doses altas, pois a vitamina C atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos**  
Alimentos não interferem com os efeitos deste produto. Evite tomar o produto juntamente com bebidas alcoólicas. O uso simultâneo com barbitúricos aumenta a necessidade diária de vitamina C. Este produto, se tomado junto com medicamentos à base de substância desferroxamina, pode potencializar os efeitos tóxicos do ferro no organismo. Salicilatos podem aumentar a eliminação urinária da vitamina C.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

##### **Direção de veículos e operação de máquinas**

Você pode dirigir e lidar com máquinas normalmente durante o tratamento com Biovita C.

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve conservar o produto dentro de sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), protegendo da luz e da umidade. Após a utilização, mantenha o frasco sempre bem fechado.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.  
Guarde-o em sua embalagem original.**

##### **Aspecto físico**

Biovita C Gotas apresenta-se como uma solução límpida, viscosa e de coloração caramelo.

##### **Características organolépticas**

Biovita C Gotas possui aroma de tutti-frutti.

A vitamina C, quando exposta ao ar e à umidade, pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da embalagem.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma**

**mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deverá ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Biovita C gotas: você pode ingerir Biovita C gotas puro ou diluído com um pouco de água.

### **Posologia**

#### **USO ORAL.**

Biovita C Gotas: cada ml corresponde a aproximadamente 25 gotas de Biovita C. Cada gota contém aproximadamente 8 mg de vitamina C.

Posologia	Lactentes		Crianças de 1 a 6 anos	Crianças de 7 a 10 anos	Crianças acima de 10 anos e adultos
	0-6 meses	7-11 meses			
Ingestão Diária Recomendada	25mg (aproximadamente 3 gotas)	30mg (aproximadamente 4 gotas)	30mg (aproximadamente 4 gotas)	35mg (aproximadamente 4 gotas)	45 mg (aproximadamente 6 gotas)
Dose diária em pediatria	25mg (aproximadamente 3 gotas) por Kg de peso até o limite de 300mg (aproximadamente 37 gotas)		25mg (aproximadamente 3 gotas) por Kg de peso até o limite de 1.000mg (aproximadamente 125 gotas)		

Doses superiores às recomendadas devem ser tomadas somente com indicação médica.

### **Risco de uso por via de administração não recomendada**

Não há estudo dos efeitos de Biovita C administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Tome a dose assim que se lembrar, mas não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, este produto pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Este produto é normalmente bem tolerado. Em algumas pessoas podem ocorrer queixas de perturbações digestivas. Essas perturbações são infreqüentes (ocorrendo entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e de pequena intensidade: azia, diarreia, enjoos, vômitos e também aumento do volume urinário. Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de medicamentos contendo vitamina C pode ocasionar cálculos renais (pedras nos rins).

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de intoxicação por dose excessiva de vitamina C. Se você tiver alguma reação adversa, suspenda o uso do produto e procure assistência médica, caso seja necessário.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.1695.0024

Farmacêutico Responsável: Glauco Fernandes Miranda – CRF/RS 5252

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA.

Rua: Flávio Francisco Bellini, 459  
Caxias do Sul – RS CEP: 95098-170

CNPJ: 29.346.301/0001-53

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (54) 4009.3210 - sac@vitamed.com.br  
[www.vitamed.com.br](http://www.vitamed.com.br)

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Data de fabricação e prazo de validade: *vide embalagem.*



# **BIOVITA C**

## **Ácido ascórbico 1g**

### **APRESENTAÇÕES**

Granulado Efervescente de 1 g.

Embalagem contendo 10 e 50 sachês com 5 g cada.

### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada sachê de granulado efervescente contém:

Ácido ascórbico (Vitamina C)..... 1 g

Excipientes qsp..... 1 sachê

(excipientes: ácido cítrico, bicarbonato de sódio, aroma sólido de laranja, sorbitol 70%, acessulfame de potássio, corante amarelo nº 6).

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Biovita C é um suplemento vitamínico indicado com auxiliar do sistema imunológico.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Biovita C corrige estados de carência de vitamina C, estimula as defesas orgânicas nas épocas de maior perigo de infecção e supre as necessidades que ocorrem em estados normais (gravidez, amamentação, atividades esportivas, trabalho intenso) e patológicos (doenças infecciosas e estados febris).

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não tome este medicamento se você sofre de cálculos renais ou de deficiência grave do funcionamento dos rins, ou ainda se você possui alergia a qualquer dos componentes da fórmula.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Advertências e Precauções**

Se você é cardíaco ou sofre de pressão alta, deve procurar orientação médica antes de tomar Biovita C, por causa de seu conteúdo de sódio (sal). Se você encontra-se em dieta com restrição de sódio, deve considerar que cada comprimido efervescente de 1g contém 0,347 g de sódio. A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames de laboratório (glicosúria, transaminases, desidrogenase lática, bilirrubina, pesquisa de sangue oculto nas fezes). É necessário interromper o uso deste produto antes desses exames.

##### **Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

Se você é diabético, sofre de hipoglicemias ou faz dieta com restrição de açúcar, procure orientação médica antes de tomar este produto, já que sua fórmula contém sacarose (açúcar).

Não existem advertências nem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

**Biovita C granulado efervescente contém sorbitol, que é melhor tolerado por diabéticos, por ser absorvido mais lentamente pelo trato gastrintestinal, mas no fígado é transformado em frutose e glicose.**

##### **Gravidez e amamentação**

Este produto pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação quando houver a necessidade de um maior suprimento de vitamina C. Entretanto, se você está grávida ou amamentando, não tome doses altas, pois a vitamina C atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

##### **Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos**

Alimentos não interferem com os efeitos deste produto. Evite tomar o produto juntamente com bebidas alcoólicas. O uso simultâneo com barbitúricos aumenta a necessidade diária de vitamina C. Este produto, se tomado junto com medicamentos à base de substância desferroxamina, pode potencializar os efeitos tóxicos do ferro no organismo. Salicilatos podem aumentar a eliminação urinária da vitamina C.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

##### **Direção de veículos e operação de máquinas**

Você pode dirigir e lidar com máquinas normalmente durante o tratamento com Biovita C.

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve conservar o produto dentro de sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), protegendo da luz e da umidade. Após a utilização, mantenha o frasco sempre bem fechado.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

##### **Aspecto físico**

Biovita C Sachês tem aspecto de um granulado de cor alaranjada.

##### **Características organolépticas**

Biovita C sachês possuem um odor característico de laranja.

A vitamina C, quando exposta ao ar e à umidade, pode ter sua coloração alterada. Preservar a integridade da embalagem.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deverá ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Biovita C Sachês: dissolva o conteúdo do sachê em um copo de água. Ingira o produto dissolvido.

### **Posologia**

#### **USO ORAL**

Biovita C Sachês: 1 sachê ao dia, ou conforme prescrição médica.

Doses superiores às recomendadas devem ser tomadas somente com indicação médica.

### **Risco de uso por via de administração não recomendada**

Não há estudo dos efeitos de Biovita C administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Tome a dose assim que se lembrar, mas não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, este produto pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Este produto é normalmente bem tolerado. Em algumas pessoas podem ocorrer queixas de perturbações digestivas. Essas perturbações são infreqüentes (ocorrendo entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e de pequena intensidade: azia, diarreia, enjoos, vômitos e também aumento do volume urinário. Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de medicamentos contendo vitamina C pode ocasionar cálculos renais (pedras nos rins).

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico**

**o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de intoxicação por dose excessiva de vitamina C. Se você tiver alguma reação adversa, suspenda o uso do produto e procure assistência médica, caso seja necessário.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.1695.0024

Farmacêutico Responsável: Glauco Fernandes Miranda – CRF/RS 5252

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA.

Rua: Flávio Francisco Bellini, 459

Caxias do Sul – RS CEP: 95098-170

CNPJ: 29.346.301/0001-53

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (54) 4009.3210 - sac@vitamed.com.br

www.vitamed.com.br

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Data de fabricação e prazo de validade: *vide embalagem.*



**BIOVITA C**  
**Ácido ascórbico 2g**

**APRESENTAÇÕES**

Comprimidos efervescentes de 2 g.  
Embalagem contendo 10 comprimidos efervescentes.

**USO ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido efervescente 2g contém:  
Ácido ascórbico (Vitamina C)..... 2 g  
Excipientes qsp..... 1 comprimido efervescente  
(excipientes: ácido tartárico, bicarbonato de sódio, sacarose, corante amarelo de tartrazina, polvaroma de laranja, ciclamato de sódio, carbowax 4000).

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Biovita C é um suplemento vitamínico indicado como auxiliar do sistema imunológico.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Biovita C corrige estados de carência de vitamina C, estimula as defesas orgânicas nas épocas de maior perigo de infecção e supre as necessidades que ocorrem em estados normais (gravidez, amamentação, atividades esportivas, trabalho intenso) e patológicos (doenças infecciosas e estados febris).

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Não tome este produto se você sofre de cálculos renais ou de deficiência grave do funcionamento dos rins, ou ainda se você possui alergia a qualquer dos componentes da fórmula.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Advertências e Precauções**

Se você é cardíaco ou sofre de pressão alta, deve procurar orientação médica antes de tomar Biovita C, por causa de seu conteúdo de sódio (sal). Se você encontra-se em dieta com restrição de sódio, deve considerar que cada comprimido efervescente de 2g contém 0,347 g de sódio. A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames de laboratório (glicosúria, transaminases, desidrogenase lática, bilirrubina, pesquisa de sangue oculto nas fezes). É necessário interromper o uso deste produto antes desses exames.

**Atenção:** Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em

pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

**Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco**

Se você é diabético, sofre de hipoglicemias ou faz dieta com restrição de açúcar, procure orientação médica antes de tomar este produto, já que sua fórmula contém sacarose (açúcar). Não existem advertências nem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos. Uso pediátrico: a dose diária recomendada de vitamina C é de 25 mg por quilo de peso, até os limites de 300 mg nas crianças em fase de amamentação e de 1000 mg nas demais crianças.

**Atenção:** este medicamento contém açúcar (sacarose), portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes.

**Gravidez e amamentação**

Este produto pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação quando houver necessidade de um maior suprimento de vitamina C. Entretanto, se você está grávida ou amamentando, não tome doses altas, pois a vitamina C atravessa a placenta e é excretada no leite materno.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Direção de veículos e operação de máquinas**

Você pode dirigir e lidar com máquinas normalmente durante tratamento com este produto.

**Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos**

Alimentos não interferem com os efeitos deste produto. Evite tomar o produto juntamente com bebidas alcoólicas. O uso simultâneo com barbitúricos aumenta a necessidade diária de vitamina C. Este produto, se tomado junto com medicamentos à base de substância desferroxamina, pode potencializar os efeitos tóxicos do ferro no organismo. Salicilatos podem aumentar a eliminação urinária da vitamina C.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve conservar o produto dentro de sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C). Proteger da luz e da umidade. Após a utilização, mantenha o tubo sempre bem fechado.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide**

**embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.  
Guarde-o em sua embalagem original.**

**Aspecto físico:** Biovita C Comprimidos Efervescentes apresentam-se na forma de comprimido redondo e alaranjado.

**Características organolépticas:** Biovita C Comprimidos Efervescentes possuem odor característico de laranja e tangerina.

A vitamina C, quando exposta ao ar e à umidade, pode ter sua coloração alterada. Preserve a integridade da embalagem.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deverá ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Como usar**

Você deve dissolver o comprimido em um copo de água e aguardar a efervescência. Após o término da mesma, ingerir o produto dissolvido.

### **Posologia**

#### **USO ORAL**

Ingerir 1comprimido ao dia, ou conforme prescrição médica. Doses superiores as recomendadas devem ser tomadas somente com indicação médica.

### **Risco de uso por via de administração não recomendada**

Não há estudo dos efeitos de Biovita C administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido ao mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Tome a dose assim que se lembrar, mas não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico**

**ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, este produto pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Este produto é normalmente bem tolerado. Em algumas pessoas podem ocorrer queixas de perturbações digestivas. Essas perturbações são infreqüentes (ocorrendo entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento) e de pequena intensidade: azia, diarreia, enjoos, vômitos e também aumento do volume urinário. Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de medicamentos contendo vitamina C pode ocasionar cálculos renais (pedras nos rins).

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através de seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não são conhecidos casos de intoxicação por dose excessiva de vitamina C. Se você tiver alguma reação adversa, suspenda o uso do produto e procure assistência médica, caso seja necessário.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.1695.0024

Farmacêutico Responsável: Glauco Fernandes Miranda – CRF/RS 5252

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA.

Rua: Flávio Francisco Bellini, 459

Caxias do Sul – RS CEP: 95098-170

CNPJ: 29.346.301/0001-53

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (54) 4009.3210 - [sac@vitamed.com.br](mailto:sac@vitamed.com.br)  
[www.vitamed.com.br](http://www.vitamed.com.br)

## **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Data de fabricação e prazo de validade: *vide embalagem.*

