

**Sulfato de Neomicina**

**Prati-Donaduzzi**

**Creme dermatológico**

**3,5 mg/g**

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

sulfato de neomicina

**Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999**

### APRESENTAÇÕES

Creme dermatológico de 3,5mg/g em embalagem com 10 g, 15 g, 20 g e 50 g.

### USO TÓPICO

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada g do creme dermatológico contém:

sulfato de neomicina.....5 mg\*

\*equivalente a 3,5 mg de neomicina base

excipiente q.s.p.....1 g

Excipientes: petrolato branco, propilenoglicol, álcool cetoestearílico, cetomacrogol 1000, metilparabeno, propilparabeno e água purificada.

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Sulfato de neomicina é indicado para o tratamento e prevenção das infecções da pele de quaisquer natureza, inclusive traumáticas ou feridas cirúrgicas.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Sulfato de neomicina creme dermatológico age de maneira a combater as principais e mais comuns infecções da pele.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar sulfato de neomicina se tiver histórico de reações de alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser aplicado sobre os olhos.

Outros antibióticos aminoglicosídeos podem apresentar reação de sensibilidade cruzada com a neomicina.

Este medicamento não deve ser aplicado sobre queimaduras graves, feridas profundas ou extensas áreas, exceto sob prescrição médica.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

As reações desagradáveis mais comuns que podem ocorrer são: vermelhidão, "rash" cutâneo (pele avermelhada com aspecto elevado), coceira no local e inchaço no local de aplicação, irritação local que não existia antes do uso do produto e ainda diminuição na audição.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.**

**Categoria de risco de gravidez: C.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter o sulfato de neomicina em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

Sulfato de neomicina apresenta-se como creme dermatológico com aspecto homogêneo, cor branca e odor característico.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sulfato de neomicina creme dermatológico é de uso tópico.

Você deve primeiramente lavar a região afetada com água e sabão apropriado e secar cuidadosamente o local.

Você deve aplicar sulfato de neomicina três vezes ao dia sobre a área lesada. Pode-se cobrir ou não com gase estéril a região onde foi aplicada o creme.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

As reações desagradáveis mais comuns que podem ocorrer são: vermelhidão, “rash” cutâneo (pele avermelhada com aspecto elevado), coceira e inchaço no local de aplicação, irritação no local que não existia antes do uso do produto e ainda diminuição na audição.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Deve-se adotar os procedimentos gerais da conduta no controle de intoxicações causadas pela via externa. Adotar medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

O apoio médico imediato é fundamental para adultos e crianças, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estiverem presentes.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

#### **DIZERES LEGAIS**

**MS - 1.2568.0196**

**Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi**

**CRF-PR 5842**

**Registrado e fabricado por:**

**PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

**Rua Mitsugoro Tanaka, 145**

**Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR**

**CNPJ 73.856.593/0001-66**

**Indústria Brasileira**

**CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor - 0800-709-9333**

**cac@pratidonaduzzi.com.br**

**www.pratidonaduzzi.com.br**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**

