

# **VIREAD**

**United Medical Ltda  
Comprimidos Revestidos  
300 mg fumarato de tenofovir desoproxila**

# **Viread®**

## **Fumarato de tenofovir desoproxila**

### **FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

VIREAD® é apresentado em frascos com 30 comprimidos. Os comprimidos têm a forma de amêndoas, são revestidos com uma película azul clara e são gravados com "GILEAD" e "4331" num dos lados e "300" no outro. Os comprimidos estão embalados em frascos com 30 comprimidos contendo um dessecante (canister ou sache de sílica gel). Os frascos são fechados por um sistema que impede a sua abertura por crianças.

### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS**

### **COMPOSIÇÃO**

Ingrediente ativo: Cada comprimido revestido contém 300 mg de fumarato de tenofovir desoproxila, equivalente a 245 mg de tenofovir desoproxila.

Ingredientes inativos: Cada comprimido contém os excipientes: croscarmelose de sódio, lactose mono-hidratada, estearato de magnésio, celulose microcristalina e amido pré-gelatinizado. Os comprimidos são revestidos com Opadry II Y-30-10671-A, o qual contém FD&C Azul nº2 laca de alumínio, hidroxipropilmetylcelulose 2910, lactose mono-hidratada, dióxido de titânio e triacetina.

### **1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

VIREAD deve ser sempre utilizado em associação com outros agentes antirretrovirais para tratar pessoas com infecção pelo HIV-1 em adultos com 18 anos ou mais.

VIREAD é também usado no tratamento da hepatite B crônica (uma infecção com o vírus da hepatite B [VHB]) em adultos com 18 anos ou mais.

VIREAD não cura a infecção pelo HIV-1 ou AIDS. Os efeitos de longo prazo de VIREAD não são conhecidos até o momento. Pessoas que tomam VIREAD permanecem em risco de contrair infecções oportunistas ou outras condições que ocorrem devido à infecção pelo HIV-1. Infecções oportunistas são infecções que se desenvolvem porque o sistema imune encontra-se debilitado. Algumas destas infecções são: pneumonia, infecções pelo vírus da herpes, infecções pelo complexo *Mycobacterium avium* (MAC).

VIREAD reduz o risco de transmissão do HIV-1 ou VHB?

VIREAD não reduz o risco de transmissão do HIV-1 ou do VHB através do contato sexual ou sangue contaminado. Continue praticando sexo seguro e não use ou compartilhe agulhas usadas. Não compartilhe artigos pessoais que possam ter sangue ou fluidos corporais, como escovas de dentes ou lâminas de barbear. Existe uma vacina para proteger as pessoas em risco de serem infectadas pelo VHB.

## **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

VIREAD é um medicamento denominado inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleotídeo (ITRN) do HIV-1 (vírus da imunodeficiência humana) e um inibidor da polimerase do VHB.

*Utilização no tratamento da infecção pelo HIV-1:*

VIREAD deve ser sempre utilizado em associação com outros medicamentos anti-HIV para tratar pessoas com infecção pelo HIV-1.

A infecção pelo HIV destrói células CD4<sup>+</sup> T que são importantes ao sistema imune. Após a destruição de um grande número de células T, o paciente desenvolve a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). VIREAD ajuda a bloquear a transcriptase reversa, uma substância química (enzima) necessária à multiplicação do HIV-1 em seu corpo. VIREAD reduz a quantidade de HIV-1 no sangue (chamada carga viral) e pode ajudar a aumentar o número de células T (chamadas células CD4). Reduzindo-se a quantidade de HIV-1 no sangue (a carga viral), reduzem-se as chances de morte ou infecções que acontecem quando o sistema imune está debilitado (infecções oportunistas).

*Utilização no tratamento da hepatite B crônica:*

VIREAD atua interferindo no funcionamento normal de uma enzima (ADN polimerase do VHB) essencial para a reprodução do vírus VHB. O VIREAD pode ajudar na redução da quantidade de vírus da hepatite B no organismo, reduzindo a capacidade do vírus de se multiplicar e de infectar novas células hepáticas.

Não sabemos por quanto tempo o VIREAD pode ajudar a combater a sua hepatite. Às vezes, os vírus modificam-se em seu organismo e os medicamentos deixam de atuar. Isto chama-se resistência ao medicamento.

O Viread pode melhorar o estado de seu fígado, mas não sabemos se o VIREAD diminuirá suas chances de contrair danos hepáticos (cirrose) ou câncer no fígado causado pela hepatite B crônica.

## **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Junto com seu médico, você deve decidir se VIREAD é certo para você.

Não tome VIREAD se:

- você for alérgico a VIREAD ou qualquer um de seus ingredientes
- se você já estiver tomando TRUVADA® (comprimido combinação de entricitabina/fumarato de tenofovir desoproxila) ou ATRIPLA™ (comprimido combinação de efavirenz/entricitabina/fumarato de tenofovir desoproxila), pois VIREAD é um dos ingredientes ativos de TRUVADA e de ATRIPLA
- você está sob tratamento com HEP SERA (adefovir dipivoxil) no momento

**Não há contra-indicação relativa a faixas etárias, no entanto a segurança e eficácia de VIREAD em pacientes abaixo de 18 anos de idade não foram estabelecidas.**

O que devo evitar enquanto estiver tomando VIREAD?

- Não amamente. Veja o item: “O que devo saber antes de usar este medicamento?”.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Fale para seu médico:

- Se você estiver grávida ou planejando engravidar. Os efeitos de VIREAD em mulheres grávidas ou no feto não são conhecidos. Você e o médico precisam decidir se o VIREAD é o medicamento correto para o seu caso. Se usar o VIREAD durante a gravidez, consulte seu médico sobre como se registrar no banco de dados VIREAD Antiviral Pregnancy Registry ([www.kindle.com/registries/](http://www.kindle.com/registries/)).
- Se você estiver amamentando: Não é conveniente amamentar se você estiver tomando VIREAD. Não se sabe se o VIREAD é excretado no leite materno e se pode prejudicar seu bebê. Não amamente se você está infectada pelo HIV. Se o bebê não tem o HIV, há uma possibilidade de contraí-lo através da amamentação no peito. Fale com o seu médico sobre qual a melhor maneira para alimentar seu bebê.
- Se você tiver problemas nos rins ou nos ossos.
- Se você tiver problemas no fígado, inclusive infecção pelo vírus da hepatite B.
- Fale com o seu médico sobre todas as suas condições médicas

Fale com o seu médico sobre todos os medicamentos que você toma, inclusive medicamentos receitados ou não receitados e suplementos nutricionais. É importante informar o seu médico se estiver tomando:

- Videx, Videx EC (didanosina). Viread pode aumentar a concentração de Videx no sangue. Você deve ter um acompanhamento mais cuidadoso se estiver tomando Videx e viread juntos. Se você estiver tomando Videx e Viread juntos, seu médico poderá reduzir sua dose de videx.
- Reyataz (sulfato de atazanavir) ou Kaletra (lopinavir/ritonavir). Estes medicamentos podem aumentar a quantidade de viread no sangue o que pode gerar mais efeitos colaterais. Se estiver tomando Viread e Reyataz ou Kaletra juntos irá precisar de acompanhamento médico cuidadoso. Viread pode diminuir a quantidade de Reyataz no seu sangue. Se você estiver tomando Viread e Reyataz juntos, você também deve tomar Norvir (ritonavir).

Mantenha uma lista completa de todos os medicamentos que você está tomando. Atualize esta lista quando qualquer medicamento for adicionado ou retirado da terapêutica. Toda vez que você for ao seu médico ou prestador de serviços de saúde forneça uma cópia dessa lista antes que ele prescreva ou avie uma receita.

**Informe seu médico da ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe seu médico se está amamentando.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use o medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**Este medicamento contém LACTOSE.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).
- Não mantenha seu medicamento em locais muito quentes ou frios.
- **Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.** Não use este medicamento se o selo de segurança estiver violado.
- **Não use medicamento com prazo de validade vencido.** Ao descartá-los certifique-se que não serão achados por crianças.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Só tome VIREAD sob orientação médica. Não mude seu tratamento nem o interrompa sem falar primeiro com o seu médico.
- Se estiver tomando VIREAD para tratar a sua infecção por HIV, ou se tiver uma infecção pelo HIV e VHB e estiver tomando VIREAD sempre tome o VIREAD em combinação com outros medicamentos anti-HIV. VIREAD e outros produtos como VIREAD podem ser menos eficazes no futuro se não tomados com outros medicamentos anti-HIV porque você pode desenvolver resistência a esses medicamentos.
- Fale com seu médico sobre a possibilidade de realizar um teste de HIV antes de começar o tratamento de hepatite B crônica com o VIREAD.
- A dose padrão de VIREAD é de 1 comprimido ao dia. Se você tem problemas renais seu médico pode recomendar que você tome VIREAD menos freqüentemente.
- VIREAD pode ser tomado com ou sem uma refeição.
- Quando o seu VIREAD estiver acabando, consiga mais com o seu médico ou farmacêutico. Isso é muito importante porque a quantidade de vírus no seu sangue pode aumentar se o medicamento for interrompido mesmo por curto período. O vírus pode desenvolver resistência a VIREAD e tornar o tratamento mais difícil.
- Só tome medicamento que tenha sido prescrito especificamente para você. Não dê VIREAD a outros e nem tome medicamentos prescritos para outras pessoas.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.**

**Advertência - O uso incorreto causa resistência do vírus da AIDS e falha no tratamento.**

**Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

É importante que você não perca nenhuma dose. Se você perder uma dose de VIREAD, tome-a o mais rápido possível, e depois tome sua próxima dose programada no horário regular. Se estiver próximo do horário de tomar a próxima dose, não tome a dose perdida e espere para tomar na hora programada. Não tome a próxima dose dobrada.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

- Estudos clínicos: Os efeitos colaterais mais comuns do VIREAD são erupção cutânea, dor de cabeça, dor, diarréia, depressão, fraqueza e náuseas. Os efeitos colaterais menos comuns incluem vômitos, tontura e gases intestinais. Estudos clínicos em pacientes com hepatite B crônica: O efeito colateral mais comum do VIREAD é náusea. Efeitos colaterais menos comuns incluem: dor abdominal, diarréia, cefaléia, tontura, fadiga, sintomas de resfriado como dor de garganta e coriza, dores nas costas e erupção cutânea.
- Experiência da comercialização: Outros efeitos colaterais relatados depois que o VIREAD foi comercializado incluem acidose láctica, problemas renais (incluindo declínio ou falência da função renal), inflamação do pâncreas, inflamação do fígado, reações alérgicas (incluindo comichão ou inchaço da face, lábios, língua ou garganta), fôlego curto, dor de barriga e alto volume de urina e sede provocada por problemas renais. Foram relatadas dor e fraqueza muscular, dor nos ossos e enfraquecimento dos ossos (o que pode contribuir para fraturas) como consequência de problemas renais.
- Alguns pacientes tratados com VIREAD tiveram problemas nos rins. Caso você tenha tido problemas renais no passado ou necessite tomar outros medicamentos que causem problemas nos rins, o seu médico pode necessitar solicitar exames de sangue adicionais.
- Testes de laboratório mostraram alterações nos ossos de pacientes tratados com VIREAD. Alguns pacientes HIV tratados com o VIREAD desenvolveram afinamento dos ossos (osteopenia) que pode causar fraturas. Caso você já tenha tido problemas ósseos no passado, o seu médico pode necessitar solicitar exames adicionais ou prescrever medicação adicional. Além disso, pode ocorrer dor nos ossos e enfraquecimento dos ossos (o que pode contribuir para fraturas) como consequência de problemas renais.
- Foram observadas alterações na distribuição de gordura corpórea em alguns pacientes que tomam medicamentos anti-HIV. Estas alterações podem incluir aumento de gordura na região dorsal e pescoço (corcova de búfalo), nos seios e ao redor do tronco. Pode ocorrer perda de gordura nas pernas, braços e face. A causa desses efeitos e o seu impacto nas condições de saúde a longo prazo não são conhecidos até o momento.
- Em alguns pacientes com infecção por HIV avançada (AIDS), sinais e sintomas de inflamação devidos a infecções anteriores podem ocorrer pouco depois do início do

tratamento com anti-HIV. Acredita-se que estes sintomas se devam a uma melhoria na resposta imune do corpo, permitindo que o corpo combata infecções que talvez já estivessem presentes embora sem sintomas óbvios. Se notar quaisquer sintomas de infecção, informe imediatamente o seu médico.

- Após interromper o tratamento com VIREAD, alguns pacientes com VHB apresentaram sintomas ou exames de sangue que comprovaram uma piora na hepatite (exacerbação). Por este motivo, seu médico deve verificar seu estado de saúde, incluindo exames sanguíneos por, no mínimo, vários meses após a interrupção do tratamento com VIREAD. Após interromper o tratamento, comunique imediatamente a ocorrência de sintomas novos ou incomuns ao seu médico.
- Se tiver uma infecção pelo VHB ou se estiver infectado por ambos os vírus HIV e VHB, você poderá ter um recrudescimento da hepatite B, durante o qual a doença reaparece repentinamente pior do que antes, caso você pare de tomar VIREAD. Não interrompa o tratamento com VIREAD sem a orientação do seu médico. Depois de interromper o tratamento com VIREAD, informe imediatamente o seu médico sobre quaisquer sintomas novos, incomuns ou agravados que notar. Após parar de tomar VIREAD, o seu médico ainda precisará avaliar o seu estado de saúde e fazer exames de sangue para checar o seu fígado durante muitos meses.
- Têm sido observados outros efeitos colaterais em pacientes que tomam VIREAD. Porém, esses efeitos colaterais podem estar associados a outros medicamentos que os pacientes estavam tomando ou à própria doença. Alguns desses efeitos colaterais podem ser graves.
- Esta lista de efeitos colaterais não está completa. Se você tem perguntas sobre os efeitos colaterais, pergunte ao seu médico, enfermeira ou farmacêutico. Você deve informar imediatamente ao seu médico sobre qualquer sintoma continuado ou novo. Seu médico pode lhe ajudar a lidar com esses efeitos colaterais.

Qual a informação mais importante que devo saber sobre VIREAD?

- Alguns indivíduos sob tratamento com VIREAD (análogos nucleosídeos) reportaram o desenvolvimento de uma condição grave chamada acidose lática (acúmulo de ácido lático no sangue). A acidose lática é uma emergência médica que deve ser tratada em um hospital. Entre em contato imediatamente com seu provedor de serviços de saúde se apresentar os seguintes sinais ou sintomas de acidose lática:
  - Fraqueza ou fadiga.
  - Dores musculares invulgares (não normais).
  - Dificuldade respiratória.
  - Dores estomacais com náusea e vômito.
  - Sensação de frio, especialmente nos braços e nas pernas.
  - Tonturas ou vertigens.
  - Batimento cardíaco acelerado ou irregular.
- Alguns indivíduos sob tratamento com medicamentos como o VIREAD desenvolveram problemas hepáticos graves, chamados hepatotoxicidade, com aumento do fígado (hepatomegalia) e gordura no fígado (esteatose hepática). Entre em contato imediatamente com seu provedor de serviços de saúde se apresentar os seguintes sinais ou sintomas de problemas hepáticos:
  - Sua pele ou o branco dos seus olhos fica amarelo (icterícia).
  - Sua urina fica escura.
  - Suas fezes ficam claras.
  - Perda de apetite por vários dias ou mais.

- Sente o estômago embrulhado (náusea).
  - Sente dores abdominais.
- Há maiores probabilidades de acidose lática se você for mulher, estiver com o peso acima do normal (obesa) ou estiver tomando medicamentos de análogos de nucleosídeos como o VIREAD, há muito tempo.

Se também estiver infectado pelo vírus da hepatite B (VHB) irá necessitar de monitoramento cuidadoso durante vários meses após interromper o tratamento com o VIREAD. O monitoramento inclui exames médicos e testes de sangue para verificar se houve um agravamento da infecção pelo VHB. Pacientes infectados pelo vírus da hepatite B, que recebiam tratamento com VIREAD e interromperam o tratamento podem sofrer exacerbações da hepatite. Uma exacerbação é o retorno súbito da doença em um estágio pior do que o anterior.

**Informe ao médico, cirurgião-dentista, ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contacto através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**“Atenção: este produto é um medicamento que possui indicação terapêutica nova no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicados e utilizados corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.”**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA.**

Reg. M.S. 1.2576.0019.001-5

Farm. Resp.: Dr. Ademir Tesser - CRF-SP n.º 14.570

**Fabricado para Gilead Sciences, Inc.  
Foster City, CA 94404 / EUA  
Produzido por Takeda, Oranienburg, Alemanha. E  
Produzido por: Patheon, Mississauga, Canadá**

**Importado por United Medical Ltda.**

Av. dos Imarés, 401 CEP 04085-000 São Paulo, SP, Brasil  
CNPJ nº 68.949.239/0001-46 Tel.: (11) 5090-7233.

SAC. 0800-770-5180  
[www.unitedmedical.com.br](http://www.unitedmedical.com.br)  
**Esta bula foi actualizada em**

VIREAD, EMTRIVA, HEP SERA e TRUVADA são marcas registradas da Gilead Sciences, Inc. ATRIPLA é uma marca comercial da Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC. Todas as demais marcas comerciais mencionadas neste folheto são propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2010, Gilead Sciences, Inc. Todos os direitos reservados.

USOCT09BRMAR10  
(Símbolo da reciclagem de papel)

