

PROPAN[®]
cloridrato de buclizina +
ASSOCIAÇÃO

Comprimidos Revestidos

PROPAN®

cloridrato de buclizina + ASSOCIAÇÃO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

PROPAN® comprimidos revestidos: cartucho contendo 20 comprimidos revestidos.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS DE IDADE VIA ORAL

COMPOSIÇÃO

cloridrato de buclizina	25 mg
tiamina - Vitamina B1 (sob a forma mononitrato)	15 mg
riboflavina - Vitamina B2	2,5 mg
cloridrato de piridoxina - Vitamina B6.....	5 mg
cianocobalamina - Vitamina B12	7,5 mcg
nicotinamida	12,5 mg
Excipientes* q.s.p.	1 comprimido

*(amido, macrogol, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, gelatina, lactose, corante amarelo crepúsculo, macrogol, álcool polivinílico, talco, polissorbato 80).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

PROPAN® COMPRIMIDO é indicado como estimulante do apetite e suplemento vitamínico para recém nascidos, lactentes, crianças em fase de crescimento e idosos.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PROPAN® COMPRIMIDO é um estimulante do apetite, suprindo ao mesmo tempo o organismo com substâncias indispensáveis ao total

aproveitamento dos alimentos ingeridos. Sua ação é explicada pela atividade de seus componentes:

A buclizina possui efeito sedativo sobre o sistema nervoso central, e também ação hipoglicemiante, estes fatos são responsáveis pelo aumento do apetite.

A adição de aminoácidos essenciais e vitaminas, especialmente do complexo B, a uma dieta deficiente é responsável por suprir as carências nutricionais, ocasionadas pela falta da ingestão de alimentos ricos destas substâncias.

Com o aumento do apetite, ocorre consequentemente ganho de peso corporal.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

PROPAN® COMPRIMIDO não deve ser utilizado em casos de hipersensibilidade ao cloridrato de buclizina ou a qualquer componente da fórmula.

PROPAN® COMPRIMIDO não deve ser utilizado por crianças menores de 12 anos de idade.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências e Precauções

Gestantes - Risco C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres que estão amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

PROPAN® COMPRIMIDO não contém açúcar, podendo ser administrado por diabéticos.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Interações Medicamentosas

Avise o seu médico sobre qualquer outra medicação que esteja usando ou que tenha usado recentemente.

O uso juntamente com álcool ou com outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central (SNC) pode potencializar os efeitos depressores sobre o SNC.

Levar em conta os riscos de adição do efeito atropíntico, em caso de associação com outras substâncias anticolinérgicas (antihistamínicos, neurolépticos, antiparkinsonianos, anticolinérgicos, antiespasmódicos, atropínicos, disopiramida, antidepressivos tricíclicos).

O ácido ascórbico pode destruir a cianocobalamina. A ingestão de grandes doses de ácido ascórbico deve ser evitada uma hora antes ou após o uso de PROPAN®.

O uso simultâneo de PROPAN® com levodopa não é recomendado. Os efeitos antiparkinsonianos da levodopa são prejudicados pela piridoxina.

PROPAN® não deve ser administrado concomitantemente com medicamentos contendo cimetidina, carbamazepina, aminoglicosídios, teofilina, fenobarbital, fenitoína e medicamentos para redução da lipidemia.

O uso concomitante com beta-bloqueadores pode causar efeito vasodilatador aditivo e hipotensão postural, devido ação da nicotinamida.

***Alterações em testes laboratoriais:* As grandes doses da riboflavina conduzem a uma descoloração amarela brilhante da urina que pode interferir com determinadas análises laboratoriais. O cloridrato de buclizina pode alterar os resultados de testes cutâneos com extratos alergênicos.**

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Características de PROPAN® COMPRIMIDO: comprimido amarelo, revestido, com odor e sabor característico.

PROPAN® COMPRIMIDO deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) protegido da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Adultos e crianças acima de 12 anos de idade: 1 comprimido duas vezes ao dia.

PROPAN® COMPRIMIDO deve ser administrado 30 minutos antes das principais refeições (almoço e jantar).

Não há estudos dos efeitos de PROPAN® COMPRIMIDO administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente pela via oral.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso se esqueça de tomar uma dose, tome-a assim que possível, no entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. **Nunca tome duas doses ao mesmo tempo.**

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Distúrbios Psiquiátricos: pode ocorrer sonolência diurna, geralmente no início do tratamento.

Distúrbios Gastrointestinais: enjôos, vômitos, diarréias, intestino preso, cólicas, queimação no estômago, boca seca.

Afecções da Pele e Distúrbios Afins: manchas de cor vermelha na pele, reação alérgica, coceira generalizada, aumento de queratina.

Distúrbio do Sistema Urinário: aumento na quantidade de urina eliminada, mau funcionamento dos rins.

Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição: alta quantidade de colesterol no sangue.

Distúrbio do Sistema Nervoso Central e Periférico: perda de sensibilidade.

Distúrbio do Sistema Respiratório: falta de ar.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Entre em contato no Serviço de Atendimento ao Consumidor UCI-FARMA pelo telefone 0800 191 291 ou pelo email sac@uci-farma.com.br .

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de superdose com PROPAN®. A superdose accidental ou voluntária pode teoricamente provocar sinais e sintomas de intoxicação, cuja gravidade depende da dose e das condições do paciente. Medidas de suporte devem ser tomadas.

A indução de vômito não é recomendada a não ser que o procedimento seja realizado por um médico, devido ao risco de aspiração do medicamento para os pulmões. O tratamento consiste na realização de medidas usuais de esvaziamento gástrico e de controle dos sintomas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Lote, Fabricação e Validade: Vide Cartucho.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 191 291
Email: sac@uci-farma.com.br

Farmacêutico Responsável: Dr. Claudio Roberto Mataruco.
CRF-SP nº 47.156

Registro MS nº 1.0550.0048.

UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Rua do Cruzeiro, 374 – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ 48.396.378/0001-82 – **Indústria Brasileira**

“Esta bula foi aprovada pela ANVISA em xx / xx / xxxx”



PROPAN[®]
cloridrato de buclizina +
ASSOCIAÇÃO

Suspensão Oral

PROPAN®

cloridrato de buclizina + ASSOCIAÇÃO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

PROPAN® suspensão oral: cartucho com frasco contendo 100 mL, acompanhado de copo-medida.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO VIA ORAL

COMPOSIÇÃO

cloridrato de buclizina	1 mg
cloridrato de L-lisina	20 mg
tiamina - Vitamina B1 (sob a forma cloridrato)	3,6 mg
riboflavina - Vitamina B2 (sob a forma fosfato sódico)	0,24 mg
cloridrato de piridoxina - Vitamina B6.....	1,1 mg
cianocobalamina - Vitamina B12	1,2 mcg
nicotinamida	2,1 mg
Veículos* q.s.p.	1 mL

*(ácido cítrico, simeticona, benzoato de sódio, citrato de sódio diidratado, cloreto de sódio, polissorbato 80, edetato dissódico, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica, sorbitol, aroma de caramelo, aroma de tangerina, corante amarelo crepúsculo, água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

PROPAN® SUSPENSÃO é indicado como estimulante do apetite e suplemento vitamínico para recém nascidos, lactentes, crianças em fase de crescimento e idosos.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PROPAN® SUSPENSÃO é um estimulante do apetite, suprindo ao mesmo tempo o organismo com substâncias indispensáveis (vitaminas e aminoácido) ao total aproveitamento dos alimentos ingeridos. Sua ação é explicada pela atividade de seus componentes:

A buclizina possui efeito sedativo sobre o sistema nervoso central, e também ação hipoglicemiante, estes fatos são responsáveis pelo aumento do apetite.

A adição de aminoácidos essenciais e vitaminas, especialmente do complexo B, a uma dieta deficiente é responsável por suprir as carências nutricionais, ocasionadas pela falta da ingestão de alimentos ricos destas substâncias.

Com o aumento do apetite, ocorre consequentemente ganho de peso corporal.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

PROPAN® SUSPENSÃO não deve ser utilizado em casos de hipersensibilidade ao cloridrato de buclizina ou a qualquer componente da fórmula.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências e Precauções

Gestantes - Risco C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Lactação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres que estão amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

PROPAN® SUSPENSÃO não contém açúcar, podendo ser administrado por diabéticos.

Durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

Interações Medicamentosas

Avise o seu médico sobre qualquer outra medicação que esteja usando ou que tenha usado recentemente.

O uso juntamente com álcool ou com outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central (SNC) pode potencializar os efeitos depressores sobre o SNC.

Levar em conta os riscos de adição do efeito atropíntico, em caso de associação com outras substâncias anticolinérgicas (antihistamínicos, neurolépticos, antiparkinsonianos, anticolinérgicos, antiespasmódicos, atropínicos, disopiramida, antidepressivos tricíclicos).

O ácido ascórbico pode destruir a cianocobalamina. A ingestão de grandes doses de ácido ascórbico deve ser evitada uma hora antes ou após o uso de PROPAN®.

O uso simultâneo de PROPAN® com levodopa não é recomendado. Os efeitos antiparkinsonianos da levodopa são prejudicados pela piridoxina.

PROPAN® não deve ser administrado concomitantemente com medicamentos contendo cimetidina, carbamazepina, aminoglicosídios, teofilina, fenobarbital, fenitoína e medicamentos para redução da lipidemia.

O uso concomitante com beta-bloqueadores pode causar efeito vasodilatador aditivo e hipotensão postural, devido ação da nicotinamida.

***Alterações em testes laboratoriais:* As grandes doses da riboflavina conduzem a uma descoloração amarela brilhante da urina que pode interferir com determinadas análises laboratoriais. O cloridrato de buclizina pode alterar os resultados de testes cutâneos com extratos alergênicos.**

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Características de PROPAN[®] SUSPENSÃO: suspensão viscosa, cor laranja, sabor e odor de tangerina/caramelo.

PROPAN[®] SUSPENSÃO deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) protegido da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Crianças até 1 ano de idade: 2,5 mL da suspensão duas vezes ao dia.

Crianças de 1 até 5 anos de idade: 5 mL da suspensão duas vezes ao dia.

Crianças de 6 até 12 anos de idade: 10 a 15 mL da suspensão duas vezes ao dia.

Adultos e crianças acima de 12 anos de idade: 25 mL da suspensão duas vezes ao dia.


PROPAN® SUSPENSÃO deve ser administrado 30 minutos antes das principais refeições (almoço e jantar).

Deve-se agitar bem o frasco de PROPAN® SUSPENSÃO antes da administração.

Para a utilização correta, as doses de PROPAN® SUSPENSÃO devem ser administradas utilizando-se o copo-medida contido na embalagem do medicamento.

O copo-medida possui indicações visuais de doses, as quais devem ser seguidas conforme prescrição médica.

Descrição do copo-medida:



1 Copo-medida de 10 mL

Não há estudos dos efeitos de PROPAN® SUSPENSÃO administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente pela via oral.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso se esqueça de tomar uma dose, tome-a assim que possível, no entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. **Nunca tome duas doses ao mesmo tempo.**

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Distúrbios Psiquiátricos: pode ocorrer sonolência diurna, geralmente no início do tratamento.

Distúrbios Gastrointestinais: enjôos, vômitos, diarréias, intestino preso, cólicas, queimação no estômago, boca seca.

Afecções da Pele e Distúrbios Afins: manchas de cor vermelha na pele, reação alérgica, coceira generalizada, aumento de queratina.

Distúrbio do Sistema Urinário: aumento na quantidade de urina eliminada, mau funcionamento dos rins.

Distúrbios do Metabolismo e da Nutrição: alta quantidade de colesterol no sangue.

Distúrbio do Sistema Nervoso Central e Periférico: perda de sensibilidade.

Distúrbio do Sistema Respiratório: falta de ar.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Entre em contato no Serviço de Atendimento ao Consumidor UCI-FARMA pelo telefone 0800 191 291 ou pelo email sac@uci-farma.com.br.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de superdose com PROPAN[®]. A superdose accidental ou voluntária pode teoricamente provocar sinais e sintomas

de intoxicação, cuja gravidade depende da dose e das condições do paciente. Medidas de suporte devem ser tomadas.

A indução de vômito não é recomendada a não ser que o procedimento seja realizado por um médico, devido ao risco de aspiração do medicamento para os pulmões. O tratamento consiste na realização de medidas usuais de esvaziamento gástrico e de controle dos sintomas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Lote, Fabricação e Validade: Vide Cartucho.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 191291
Email: sac@uci-farma.com.br

Farmacêutico Responsável: Dr. Claudio Roberto Mataruco.
CRF-SP nº 47.156

Registro MS nº 1.0550.0048

UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Rua do Cruzeiro, 374 – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ 48.396.378/0001-82 – **Indústria Brasileira**

“Esta bula foi aprovada pela ANVISA em xx / xx / xxxx”

