



PARCEL[®]

mesilato de diidroergotamina + paracetamol + cafeína

Embalagens com 20 drágeas.

USO ORAL

USO ADULTO

Composição: cada drágea contém 1 mg de mesilato de diidroergotamina, 450 mg de paracetamol e 40 mg de cafeína.

Excipientes: povidona, lactose, amido de milho, ácido esteárico, talco, sacarose, macrogol, gordura vegetal, álcool cetílico, óxido de ferro amarelo, laca de indigocarmina, celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal e dióxido de titânio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

PARCEL é indicado para os casos de dor de cabeça e enxaqueca.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PARCEL é um analgésico que contém as substâncias diidroergotamina, paracetamol e cafeína. A diidroergotamina age sobre os vasos sanguíneos cranianos; o paracetamol possui efeito analgésico acentuado; a cafeína reforça os efeitos da diidroergotamina e do paracetamol para o alívio das dores de cabeça e dores leves.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome PARCEL se você for alérgico a qualquer componente do produto (veja o item “composição” desta bula). PARCEL não deve ser tomado por pessoas que tenham obstruções (entupimentos) vasculares graves.

Não use outro medicamento que contenha paracetamol.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 18 anos.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

PARCEL deve ser utilizado por poucos dias para o tratamento de episódios dolorosos, não devendo ser empregado em tratamentos prolongados ou com finalidade preventiva. Os pacientes que apresentem casos de doenças renais ou hepáticas graves ou doenças relacionadas com a formação das células sanguíneas devem ter cautela durante o uso de PARCEL.

Deve-se evitar a ingestão concomitante de PARCEL com os antibióticos eritromicina e troleandomicina. PARCEL não deve ser administrado simultaneamente com anticoagulantes orais, pois estes terão seus efeitos potencializados. Em caso de dúvida, consulte um médico.

Durante a gravidez e amamentação deve-se evitar o uso de Parcel, a não ser que estritamente indicado.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto deve ser mantido à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

Aspecto físico e organolépticos: PARCEL é uma drágea (comprimido revestido) verde claro, redondo, biconvexo (arredondado externamente) e com odor característico.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.



Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar: os adultos devem tomar inicialmente 1 ou 2 drágeas, repetindo-se, se necessário, após 30 minutos. A dose máxima diária é de 6 drágeas ao dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se uma dose de PARCEL for esquecida, aguarde até o horário da próxima dose para tomá-lo. Não tome medicamento fora do horário orientado por seu médico e jamais tome dose dobrada em caso de esquecimento da dose anterior.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Podem ocorrer náuseas, vômitos, reações cutâneas, fraqueza nas pernas, dores musculares, entorpecimento e formigamento dos dedos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A dosagem excessiva, maciça e aguda do paracetamol pode ser prejudicial ao fígado. Consulte um médico se você tomar acidentalmente uma superdose de PARCEL.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS - 1.0068.0086

Farm. Resp.: Virginia da Silva Giraldi - CRF-SP 15.779

Fabricado por: Novartis Biociências S.A., Taboão da Serra – SP

Registrado por: Novartis Biociências S.A.

Av. Prof. Vicente Rao, 90, São Paulo – SP

CNPJ: 56.994.502/0001-30 - Indústria Brasileira



Venda sob prescrição médica.

VP02

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em (03/10/2012)

