



PHARMATON® KIDDI

(polivitamínico e lisina)

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.

PHARMATON® KIDDI Frasco com 200 mL

Pharmaton® Kiddi
polivitamínico, e lisina

APRESENTAÇÃO

Xarope: frasco com 200 ml + copo-medida graduado

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO

COMPOSIÇÃO

| COMPOSIÇÃO | % IDR (INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA) | | POSOLOGIA (mL) / IDADE EM ANOS | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------|------|---------|
| | 1 ml | 15 ml | 1-3 | 4-5 | 6 | 7-10 | Adultos |
| lisina (cloridrato de lisina) | 20,00 mg | 300,00 mg | * | * | * | * | * |
| vitamina B1 (cloridrato de tiamina) | 0,20 mg | 3,00 mg | 236% | 197% | 393% | 262% | 197% |
| vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina) | 0,23 mg | 3,50 mg | 275% | 229% | 458% | 305% | 212% |
| vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 0,40 mg | 6,00 mg | 494% | 494% | 988% | 494% | 380% |
| vitamina D3 (colecalciferol) | 26,67 UI | 400 UI | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% |
| vitamina E (acetato de racealfatocoferol) | 1,00 mg | 15,0 mg | 101% | 101% | 201% | 144% | 101% |
| vitamina PP (nicotinamida) | 1,33 mg | 20,0 mg | 167% | 125% | 250% | 167% | 125% |
| dexpantenol | 0,67 mg | 10,0 mg | 250% | 167% | 333% | 250% | 200% |

*Não estabelecido.

Outro componente: cálcio.

Excipientes: sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido ascórbico, sorbitol, aspartamo, acessulfamo potássico, óleo de rícino hidrogenado etoxilado, essência de laranja, essência de tangerina, caramelo sódica, edetato dissódico, ácido cítrico monoidratado, ácido fosfórico, água purificada.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

PHARMATON KIDDI é indicado para períodos de necessidade aumentada de vitaminas, especialmente durante o período de crescimento. Pode ser usado na prevenção da deficiência de vitaminas, nas dietas restritas, no período de recuperação, após cirurgias, doenças infecciosas ou outras doenças.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

PHARMATON KIDDI é uma formulação suíça balanceada com vitaminas e lisina.

As vitaminas do complexo B são necessárias para as funções metabólicas normais e a lisina é um aminoácido essencial, importante para a formação óssea, além de colaborar para a formação de colágeno e proteínas, entre outras funções.

Por ser um polivitamínico, não é possível determinar com precisão o tempo para início da ação. O medicamento deve ser utilizado pelo tempo necessário para corrigir ou prevenir eventuais deficiências conforme indicação.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar PHARMATON KIDDI se tiver alterações no metabolismo do cálcio, como nível aumentado de cálcio no sangue e aumento da eliminação de cálcio na urina; vitamina D em excesso, mau funcionamento dos rins, pedra nos rins, fenilcetonúria (falta de uma enzima que impede o metabolismo e a eliminação do aminoácido fenilalanina do corpo), alergia a qualquer um dos componentes da fórmula e intolerância à frutose. Você também não deve tomar PHARMATON KIDDI se tiver tomando outro medicamento com vitamina D.

Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

PHARMATON KIDDI contém 3,75 g de sorbitol (correspondente a 2,6 g de sorbitol anidro) em 15 ml, dose diária máxima recomendada. Se você tiver intolerância à frutose não use este medicamento.

PHARMATON KIDDI contém 3,6 g de carboidratos em 15 ml, dose diária máxima recomendada.

Atenção diabéticos, contém açúcar.

Estudos sobre o efeito na habilidade de dirigir e operar máquinas não foram realizados.

Fertilidade, Gravidez e Amamentação

PHARMATON KIDDI só deve ser utilizado durante a gravidez ou amamentação se o médico considerar essencial em relação ao risco e benefício.

Estudos sobre o efeito de PHARMATON KIDDI na fertilidade humana não foram realizados.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interação Medicamentosa: A vitamina B6 pode diminuir a eficácia da levodopa.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha o frasco bem fechado, em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) e protegido da luz.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guard-e-o em sua embalagem original.

PHARMATON KIDDI é um líquido viscoso, com coloração amarelo-alaranjada, podendo apresentar turvação. Possui odor de laranja e sabor adocicado de laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Agite bem antes de usar.

Você ou a criança deve ingerir PHARMATON KIDDI, por via oral, junto com o café da manhã ou almoço. Você pode diluir em água ou sucos, ou misturar com alimentos e papinhas.

Use o copo-medida para medir a quantidade do xarope.

Dose recomendada:

Crianças de 1 a 5 anos: 7,5 ml por dia.

Crianças com idade superior a 5 anos, adolescentes e adultos: 15 ml por dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Continue tomando as próximas doses regularmente no horário habitual. Não duplique a dose na próxima tomada. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reação com frequência desconhecida: hipersensibilidade (alergia).

Atenção: este produto é um medicamento que possui nova associação no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdose accidental, procure sempre orientação médica.

Após ingerir altas doses do medicamento, pode surgir um efeito tóxico devido à toxicidade da vitamina D.

Pode ser necessário o tratamento da hipercalcemia (aumento dos níveis de cálcio no sangue) causada pela ingestão de altas doses de vitamina D. Nestes casos, você deve interromper o tratamento e diminuir a ingestão de cálcio.

A ingestão diária prolongada de quantidades maiores que 75 mL do produto pode causar sintomas de toxicidade crônica tais como vômitos, dor de cabeça, sonolência e diarreia, seguidos por sede excessiva, aumento da produção de urina, fraqueza, nervosismo e pressão alta. Os sintomas agudos somente são observados com doses ainda mais elevadas. Em adultos, a dose tóxica aguda de vitamina D corresponde, aproximadamente, à ingestão de 25.000-50.000 UI (contidas em 937-1.875 mL).

Conforme literatura atual observou-se que a ingestão de altas doses de vitamina B6 pode estar associada à perda sensorial, atrofia e fraqueza muscular.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

MS - 1.0367.0164

Farm. Resp.: Dímitra Apostolopoulou – CRF-SP 08828

Importado por:

Boehringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. Ltda.

Rod. Régis Bittencourt, km 286

Itapecerica da Serra – SP

CNPJ 60.831.658/0021-10

SAC 0800 701 6633

Fabricado por:

Ginsana SA

Lugano-Bioggio – Suíça

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 05/01/2015.



20130308

X15-00

Histórico de Alteração da Bula

| Dados da submissão eletrônica | | | Dados da petição/notificação que altera bula | | | | Dados das alterações de bulas | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|------------------|--|-------------------|--|------------------|----------------------------|
| Data do expediente | Nº do expediente | Assunto | Data do expediente | Nº do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas |
| 11/04/2013 | 0276218138 | 10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12 | 11/04/2013 | 0276218138 | 10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12 | 11/04/2013 | Envio inicial do texto de bula harmonizada à Bula Padrão em cumprimento ao Guia de submissão eletrônica de bula e RDC 47/09. | VP/VPS | Xarope x 200 mL |
| 09/01/2015 | | 10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 | 28/11/2014 | 1082757/14-9 | 10606 - ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula - adequação dos medicamentos com princípios ativos (vitaminas, minerais e/ou aminoácidos) abaixo de 25% da IDR. | 05/01/2015 | Bula do paciente: DCB COMPOSIÇÃO 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Bula do profissional da saúde: DCB COMPOSIÇÃO 2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES | VP/VPS | Xarope x 200 mL |