



Multiderm

Multilab Indústria e Comércio de Produtos farmacêuticos Ltda

Pomada dermatológica

palmitato de retinol (vit. A)	5.000 UI
colecalciferol (vit. D)	900 UI
óxido de zinco	150,0 mg

MULTIDERM

palmitato de retinol, colecalciferol, óxido de zinco

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES:

Pomada Dermatológica

Cartucho com bisnaga contendo 45 g.

Caixa com 154 bisnagas contendo 45 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada g da pomada dermatológica contém:

palmitato de retinol (vit. A) 5.000 UI

colecalciferol (vit. D) 900 UI

óxido de zinco 150,0 mg

Excipientes q.s.p 1,0 g

(lanolina anidra, petrolato branco, óleo mineral, talco, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno, óleo de fígado de bacalhau, essência de baunilha, essência de lavanda, butilidroxitolueno).

I. INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

A associação do palmitato de retinol, colecalciferol e óxido de zinco possui ação adstringente e antisséptica local.

2. CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula;

"Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

“Informar ao médico se está amamentando.”

3. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Limpar cuidadosamente a pele antes de aplicar a pomada Multiderme.

"Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

4. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DO MEDICAMENTO

Características físicas: Pomada de cor branca, homogênea. Livre de grânulos e partículas estranhas.

O produto deve ser conservado à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), ao abrigo da luz e umidade.

O prazo de validade é de 24 meses após a data de fabricação. Não use medicamento com prazo de validade vencido.

"Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem"

"Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original."

"Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças."

5. POSOLOGIA

- Adulto: limpar a área afetada e aplicar Multiderme, sempre que necessário.
- Criança: a cada troca de fraldas, limpe cuidadosamente a pele do bebê e aplique uma camada de Multiderme sobre a área a proteger, massageando suavemente.

6. REAÇÕES ADVERSAS

Foram observadas as seguintes reações adversas, das comuns para as muito raras com o uso deste medicamento:

Reação muito comum (>10%): não foi relatada nenhuma reação adversa nessa frequencia.

Reação comum (>1% e <10%): não foi relatada nenhuma reação adversa nessa frequencia.

Reação incomum (>0,1% e < 1%): não foi relatada nenhuma reação adversa nessa frequencia.

Reação rara (> 0,01% e < 0,1%): Prurido ou vermelhidão intensa.

Reação muito rara: (< 0,01%): não foi relatada nenhuma reação adversa nessa frequencia.

"Em casos de eventos adverso, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal".

7. SUPERDOSAGEM

"Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações "

"Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica"

II. DIZERES LEGAIS

MULTILAB Ind e Com de Produtos Farm. Ltda
RS 401 – Km 30 – nº 1009 – São Jerônimo - RS
CEP 96700-000 – CNPJ 92.265.552/0001-40
Data fabricação, lote e validade: VIDE EMBALAGEM
Reg. MS nº 1.1819.0032
Farm Resp.: Filipe Thomas Steger
CRF-RS 10473



INDÚSTRIA BRASILEIRA
SAC 0800 600 0660
VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

"Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica"



HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE BULA

Número do expediente	Nome do assunto	Data da notificação/ petição	Data de aprovação da petição	Itens alterados
-	10461-ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	01/07/2014	N/A	1ª submissão