

Pidomag[®]
(pidolato de magnésio)

Laboratórios Baldacci Ltda.

Flaconetes

PIDOMAG®
pidolato de magnésio

APRESENTAÇÕES

Solução Oral de 150mg/mL – cartucho com 12 flaconetes de 10 mL.

VIA ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO.

COMPOSIÇÃO

Cada flaconete de **PIDOMAG®** contém:
pidolato de magnésio.....1,5 g*.

Veículo q.s.p.10,0 mL

Veículo: metilparabeno, propilparabeno, açúcar refinado, aroma de tangerina, aroma de laranja e água purificada.

*Equivalente a 130mg do elemento magnésio.

Tabela de Ingestão Diária Recomendada		
Faixa etária	IDR por flaconete**	IDR pela posologia diária máxima***
Uso Adulto	50%	100% (2 flaconetes)
Uso Pediátrico	100%	100% (1 flaconete)

** Teor Percentual do magnésio no flaconete, relativo á Ingestão Diária Recomendada.

*** Teor percentual do magnésio na posologia máxima indicada na bula relativo à Ingestão Diária Recomendada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado como suplemento mineral usado em dietas restritivas e inadequadas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento funciona repondo os níveis de magnésio no seu organismo.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar **PIDOMAG®** se tiver alergia ao pidolato de magnésio ou aos outros componentes da fórmula.

Este medicamento é contra-indicado para uso por pessoas com insuficiência renal grave.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento contém açúcar (200mg/mL), portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes.

Não são conhecidas restrições do uso de **PIDOMAG®** juntamente com alimentos.

PIDOMAG não deve ser utilizado junto com produtos que contenham fosfatos. Se você estiver usando tetraciclina ou produto contendo cálcio e de uso oral, deverá tomar o **PIDOMAG®** com intervalos de 3 horas entre estes medicamentos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Informar ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **PIDOMAG®** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e da umidade. Dentro destas condições o seu prazo de validade é de 24 meses após a data de fabricação. Após abertura do flaconete, o produto deve ser consumido imediatamente.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

A solução oral de **PIDOMAG®** é límpida amarelada.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Após abertura do flaconete, o produto deve ser consumido imediatamente por via oral.

Adultos: Dois flaconetes de **PIDOMAG®**, ao dia, ou a critério médico.

Crianças: Um flaconete de **PIDOMAG®** por dia, ou a critério médico.

O tratamento deve durar até a melhoria dos sintomas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar a dose seguinte como de costume, isto é, na hora regular e sem dobrar a dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Estudos experimentais realizados durante a gravidez, demonstraram que o magnésio não provoca nenhum efeito prejudicial ao feto. A experiência clínica realizada com o medicamento, não evidenciou efeitos indesejáveis. Eventualmente e dependendo da sensibilidade do paciente, poderá instalar-se um quadro diarréico.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O uso de quantidade maior do que a indicada pode causar diarréia ou contração muscular leve e contínua. Em caso de administrar uma dose maior que a recomendada em bula acidentalmente, deve procurar um médico ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estejam presentes.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. Nº 1.0146.0058.

Farm. Resp.: Dra. Erika Mayumi Matsumoto – CRF-SP 27.346



LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA

Rua Pedro de Toledo, 520 - Vl. Clementino - São Paulo - SP

CNPJ: 61.150.447/0001-31

Indústria Brasileira

SAC
0800 133 222

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**



4719

"Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 14/04/2014"

Anexo B

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera a bula				Dados da alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
15/04/2013	0286735134	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	15/04/2013	0286735134	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12		Inclusão Inicial de Texto de Bula	VP/VPS	150mg/ml sol oral 12 flac x 10ml
		10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12			10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12		Alteração da identidade visual da empresa e de dizeres legais.	VP/VPS	150mg/ml sol oral 12 flac x 10ml