

BASEINA
(Enema de Glicerina 12%)

Glicerol (D.C.B.: 04468)

APRESENTAÇÃO

Glicerol 120mg/mL

- Caixa com 24 frascos de polipropileno com 500 mL, cápsula retal,

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: RETAL E INDIVIDUALIZADA.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Glicerol (D.C.B.: 04468)..... 0,12 g

Excipiente: água para injetáveis.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é utilizado no tratamento intestinal eficaz como auxiliar nos exames radiológicos.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A glicerina é classificada como laxante, hiperosmótico. Os laxantes hiperosmóticos provocam aumento da água na luz intestinal, o aumento da água estimula a motilidade do intestino e a evacuação. A glicerina também age lubrificando e amolecendo as fezes impactadas. A glicerina atua uma função laxante sobre a parede do intestino, provocando aumento dos movimentos peristálticos.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado em caso de apendicite, pólipos que esteja recuperando de cirurgia retal e em caso de sangramento retal não diagnosticado pelo médico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A glicerina deve ser utilizada com precaução por pacientes com risco de hipervolemia, insuficiência cardíaca ou distúrbio renal. Pessoas desidratadas devem utilizar o medicamento com precaução, uma vez que há o risco de agravar esta condição. Não reutilizar a embalagem vazia. Manter o produto em sua embalagem original. Não usar se houver presença de material estranho, variação ou violação do recipiente.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER USADO POR MULHERES GRAVÍDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:
Solução de Glicerina pode ser administrada em pacientes de qualquer idade, não havendo restrições. Cede que haja acompanhamento médico. Não há recomendações especiais para este grupo de pacientes.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

O uso crônico de laxantes hiperosmóticos pode diminuir a ação de suplementos de potássio e de diuréticos poupadores de potássio, promovendo a redução do potássio sanguíneo.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha o produto em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

basal

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA BASA LTDA
Av. Rossetti, 696 - Caxias do Sul - RS
CNPJ 88.610.555/0001-04
SAC 0800 6003944
Indústria Brasileira



basal

Prazo de validade a partir da data de fabricação: 24 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, usar imediatamente. Depois de aberto este medicamento, por ser de caráter estéril, não se pode em hipótese alguma a guarda e conservação das soluções utilizadas, devendo as mesmas serem descartadas. Antes de serem administradas estas soluções devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária. Não utilizar se detectado partículas ou algum tipo de precipitado. Este medicamento é um líquido, límpido, incolor e inodoro, isento de partículas estranhas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O enema glicerinado deve ser administrado via retal, à critério médico.

Adultos e crianças: O volume da solução a ser administrado dependerá da necessidade individual de cada paciente e do parecer médico.

Modo de Usar:

A solução armazenada deve ter uso retal, à critério médico.

Para adultos:

- 1- Romper o lacre, puxando o anel.

Aplicação:

- 1- Retirar o aplicador com a câmbula do seu plástico;
- 2- Conectar o aplicador no local de inserção do frasco;
- 3- Insuflar suavemente a câmbula do aplicador no reto;
- 4- Conter o frasco até ser expelido quase todo o líquido;
- 5- Retirar a câmbula do reto;
- 6- O efeito laxativo se faz sentir após 15 a 30 minutos da aplicação.

Duração do tratamento à critério médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Por se tratar de um produto de ação local, o mesmo não apresenta nenhuma reação adversa além do efeito esperado, tais como, cólicas intestinais e cefaleia. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não apresenta, mas de qualquer forma qualquer dúvida procure orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 08007228081, se você precisar de mais orientações.

Farm. Basa - Glauher J. Bandin - CRF-RS Nº 11855

Reg.M.S. nº 1.0725.0282