



**MALVONA®**

Laboratório Daudt Oliveira Ltda  
Solução  
benzocaína 0,20 mg/mL  
borato de sódio 60,00 mg/mL  
cloreto de cetilpiridínio 1,00 mg/mL

## **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

### **MALVONA®**

**benzocaína(0, 20 mg/mL), borato de sódio(60,00 mg/mL),  
cloreto de cetilpiridínio(1,00 mg/mL)**

### **APRESENTAÇÃO**

Frascos contendo 100 mL e 200 mL.

### **SOLUÇÃO - VIA ORAL**

### **USO ADULTO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada mL contém:

benzocaína..... 0,20 mg;  
borato de sódio.....60,00 mg;  
cloreto de cetilpiridínio.....1,00 mg.

Excipientes\* ..... q.s.p. 1 mL.

\*álcool etílico, *Malva sylvestris* L. (extrato fluído), fenosalil, mentol, sacarina sódica, sorbitol (solução a 70%), óleo essencial de *Eucalyptus globulus*, óleo essencial de menta e água purificada.

**Este produto contém álcool em sua composição (0,36 mL/mL).**

### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Malvona®** é destinado ao tratamento das afecções da boca, gengiva e garganta e é indicada para o alívio dos sintomas da dor de garganta.

#### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**Malvona®** é um medicamento com propriedades antisséptica e anestésica, que atua na prevenção e tratamento das afecções da boca, gengiva e garganta.

#### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Malvona®** não deve ser utilizada por pacientes que tenham alergia a qualquer um dos componentes de sua formulação.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Malvona®** é um produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe ao seu médico se está amamentando.

**Este medicamento contém álcool em sua composição.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Não são conhecidas até o momento interações medicamentosas com o uso deste medicamento.

**Uso em pacientes idosos:** não há recomendações especiais sobre o uso de **Malvona®** por pacientes idosos.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Malvona®** deve ser guardada em sua embalagem original, com o frasco bem fechado, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz solar.

**Número do lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Malvona® necessita ser diluída em água antes de seu uso.**

Bochechos ou gargarejos: dilua uma colher de chá (5 mL) em um copo com 50 mL de água fria ou morna. Usar 4 a 5 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções médicas ou odontológicas.

No caso de aftas, se preferir, embeba um pedaço de algodão na solução e aplique diretamente sobre a lesão.

**Atenção:** **Malvona®** deve ser utilizada exclusivamente por via oral, através de bochechos ou gargarejos. Portanto, não deve ser ingerida.

Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso de **Malvona®**.

**Malvona® contém extratos naturais que podem ficar aparentes.**

**AGITE BEM ANTES DE USAR.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você tenha esquecido ou estiver impossibilitado de usar este medicamento nos horários pré-determinados, tão logo seja possível, retorne ao seu uso conforme recomendado.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Até o momento não foi relatada nenhuma reação adversa grave. Caso seja observada alguma reação não desejada, suspenda o uso do medicamento e procure orientação médica.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

MS 1.0143.0068

Farm. Resp. Michele Vieira Espíndola – CRF / RJ 17419

Laboratório Daudt Oliveira Ltda.

Rua Simões da Mota, 57 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ 33.026.055/0001-20

Indústria Brasileira

SAC 0800 707 0987

sac@grupodaudt.com.br

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**



#### **Histórico de Alteração da Bula**

| <b>Número do expediente</b> | <b>Nome do Assunto</b> | <b>Data da notificação/petição</b> | <b>Data de aprovação da petição</b> | <b>Itens alterados</b> |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| NA                          | NA                     | NA                                 | NA                                  | NA                     |