



# Clocef<sup>®</sup>

**Pó para solução injetável 1g e Pó para solução injetável 2g**

---

# **MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**



## **Clocef®**

cloridrato de cefepima

---

### **APRESENTAÇÕES**

#### **Pó para solução injetável 1g**

Embalagem contendo 01 frasco-ampola + ampola de diluente com 3mL.

Embalagem contendo 50 frascos-ampola.

#### **Pó para solução injetável 2g**

Embalagens contendo 01 e 50 frascos-ampola.

### **USO INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 MESES**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada frasco-ampola de solução injetável 1g contém:

cloridrato de cefepima + L-arginina estéril (equivalente a 1g de cefepima).....1,914213g

Cada frasco-ampola de solução injetável 2g contém:

cloridrato de cefepima + L-arginina estéril (equivalente a 2g de cefepima).....3,828426g

### **INFORMAÇÕES AO PROFISSIONAL DE SAÚDE**

#### **1. INDICAÇÕES**

**Adultos:** Clocef® é indicado no tratamento, em adultos, das infecções relacionadas a seguir, quando causadas por bactérias sensíveis à cefepima:

- Infecções do trato respiratório inferior, incluindo pneumonia e bronquite;
- Infecções complicadas do trato urinário, incluindo pielonefrite e infecções não complicadas do trato urinário;
- Infecções da pele e estruturas cutâneas;
- Infecções intra-abdominais, incluindo peritonite e infecções do trato biliar;
- Infecções ginecológicas;
- Septicemia;

-Terapia empírica em pacientes neutropênicos febris: monoterapia com cefepima é indicada para o tratamento empírico de pacientes neutropênicos febris. Em pacientes com alto risco de infecção grave (por exemplo, pacientes com histórico de recente transplante de medula óssea, com hipotensão desde o início do acompanhamento, com malignidade hematológica subjacente, ou com neutropenia grave ou prolongada), monoterapia antimicrobiana pode não ser apropriada. Não há dados suficientes que comprovem a eficácia da monoterapia com cefepima nestes pacientes. Clocef® também está indicado para a profilaxia cirúrgica em pacientes submetidos à cirurgia de cólon e reto.

**Pediatria:** Clocef® é indicado no tratamento, em pacientes pediátricos, das infecções relacionadas a seguir, quando causadas por bactérias sensíveis à cefepima:

-Pneumonia;  
-Infecções complicadas do trato urinário, incluindo pielonefrite e infecções não complicadas do trato urinário;  
-Infecções da pele e estruturas cutâneas;  
-Septicemia;  
-Terapia empírica em pacientes neutropênicos febris: monoterapia com cefepima é indicada para o tratamento empírico de pacientes neutropênicos febris. Em pacientes com alto risco de infecção grave (por exemplo, pacientes com histórico de recente transplante de medula óssea, com hipotensão desde o início do acompanhamento, com malignidade hematológica subjacente, ou com neutropenia grave ou prolongada), monoterapia antimicrobiana pode não ser apropriada. Não há dados suficientes que comprovem a eficácia da monoterapia com cefepima nestes pacientes.  
-Meningite bacteriana;  
Devem ser realizados testes de cultura e sensibilidade quando apropriados para se determinar a sensibilidade do patógeno à cefepima. A terapia empírica com Clocef® pode ser instituída antes de se conhecer os resultados dos testes de sensibilidade; entretanto, a antibioticoterapia deverá ser ajustada de acordo com os resultados, assim que estiverem disponíveis.  
Devido ao seu amplo espectro de atividade bactericida contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Clocef® pode ser usado como monoterapia antes da identificação do(s) patógeno(s). Em pacientes sob risco de infecções mistas de aeróbios-anaeróbios, particularmente se bactérias não sensíveis à cefepima estiverem presentes, terapia inicial concomitante com um agente antianaeróbio é recomendada antes que o patógeno seja conhecido. Uma vez que estes resultados estiverem disponíveis, a terapia concomitante com Clocef® e outros agentes anti-infecciosos pode ou não ser necessária, dependendo da sensibilidade do microrganismo.

## 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

**Pacientes Neutropênicos Febris:** a segurança e eficácia da monoterapia empírica com cefepima para pacientes neutropênicos febris foram avaliadas em dois estudos multicêntricos, randomizados, comparando monoterapia com cefepima (dose de 2g a cada 8 horas, IV) à monoterapia com ceftazidima (dose de 2g a cada 8 horas, IV). Esses estudos foram realizados com 317 pacientes. A Tabela 1 descreve as características da população de pacientes avaliáveis.

**Tabela 1:**  
**Demografia dos pacientes avaliáveis (apenas primeiros episódios)**

	<b>cefepima (n=164)</b>	<b>ceftazidima (n=153)</b>
Idade média (anos)	56 (faixa 18-32)	55 (faixa 16-84)
Homens	86 (52%)	85 (56%)
Mulheres	78 (48%)	68 (44%)
Leucemia	65 (40%)	52 (34%)
Outras malignidades hematológicas	43 (26%)	36 (24%)
Tumor sólido	54 (33%)	56 (37%)
CAN nadir médio (céls/ $\mu$ L)	20,0 (faixa 0-500)	20,0 (faixa 0-500)
Duração média da	6,0 (faixa 0-39)	6,0 (faixa 0-32)

neutropenia (dias)		
Catéter venoso de demora	97 (59%)	86 (56%)
Profilaxia com antibiótico	62 (38%)	64 (42%)
Corrupção da medula	9 (5%)	7 (5%)
PAS < 90 mm Hg na entrada	7 (4%)	2 (1%)

CAN = contagem absoluta de neutrófilos; PAS = pressão arterial sistólica

A Tabela 2 descreve as taxas das respostas clínicas observadas. Para todos os resultados medidos, a cefepima mostrou-se terapeuticamente equivalente a ceftazidima.

<b>Tabela 2</b> <b>Taxas de respostas conjuntas para terapia empírica em pacientes neutropênicos febris</b>			
<b>% Resposta</b>			
		<b>cefepima (n=164)</b>	<b>ceftazidima (n=153)</b>
Episódio primário resolvido sem modificação no tratamento, não houve novos episódios febris ou infecção, e o uso de antibióticos orais foi permitido para complementar o tratamento.		51	55
Episódio primário resolvido sem modificação no tratamento, não houve novos episódios febris ou infecção, e antibióticos orais não foram utilizados no pós-tratamento.		34	39
Sobrevivência, com permissão de qualquer modificação no tratamento.		93	97
Episódio primário resolvido sem modificação no tratamento e antibióticos orais foram permitidos para complementar o tratamento.		62	67
Episódio primário resolvido sem modificação no tratamento, e antibióticos orais não foram utilizados no pós-tratamento.		46	51

Não existem dados suficientes que comprovem a eficácia da monoterapia com cefepima em pacientes com alto risco de infecções severas (incluindo pacientes com histórico de recente transplante de medula, com hipotensão desde o início do acompanhamento, com malignidade hematológica subjacente, ou com neutropenia grave ou prolongada). Não há dados sobre pacientes com choque séptico.

**Profilaxia Cirúrgica:** esta indicação está baseada em um estudo clínico randomizado, aberto, multicêntrico com pacientes de 19 anos de idade ou mais (média de idade de 66 anos) submetidos à cirurgia colorretal, nos quais uma administração pré-cirúrgica IV de uma dose única de 2g de cefepima seguida de uma dose única IV de 500mg de metronidazol (N=307) foi comparada com uma dose única IV de 2g de ceftriaxona seguida por metronidazol (N=308).

A administração da dose variou de 0 a 3 horas antes da incisão cirúrgica inicial. As taxas de sucesso clínico (ausência de infecções intra-abdominais e na região cirúrgica durante as 6 semanas após a cirurgia) foram de 75% em cada grupo de tratamento.

### 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**Descrição:** Clocef® (cloridrato de cefepima) pó para solução injetável é um antibiótico cefalosporínico de amplo espectro para administração intramuscular (IM) ou intravenosa (IV).

Clocef® é uma mistura estéril de cloridrato de cefepima e L-arginina. A L-arginina, em uma concentração de cefepima, é adicionada para controlar o pH da solução reconstituída entre 4,0 e 6,0.

**Propriedades Farmacocinéticas:** as concentrações plasmáticas médias de cefepima observadas em adultos sadios do sexo masculino em vários momentos após infusões intravenosas únicas de 30 minutos ou injeções intramusculares com 500mg, 1g e 2g estão resumidas na Tabela 3.

Tabela 3 Concentrações plasmáticas médias de cefepima ( $\mu\text{g/mL}$ ) em pacientes adultos sadios do sexo masculino						
Dose de cefepima	0,5h	1h	2h	4h	8h	12h
500mg IV	38,2	21,6	11,6	5,0	1,4	0,2
1g IV	78,7	44,5	24,3	10,5	2,4	0,6
2g IV	163,1	85,8	44,8	19,2	3,9	1,1
500mg IM	8,2	12,5	12	6,9	1,9	0,7
1g IM	14,8	25,9	26,3	16,0	4,5	1,4
2g IM	36,1	49,9	51,3	31,5	8,7	2,3

**Absorção:** após administração intramuscular, a cefepima é completamente absorvida.

**Distribuição:** as concentrações de cefepima em tecidos e nas secreções corpóreas específicas estão apresentadas na Tabela 4.

A ligação da cefepima às proteínas séricas é em média de 16,4% e não depende da concentração no soro.

Tabela 4 Concentrações médias de cefepima em várias secreções corpóreas ( $\mu\text{g/mL}$ ) e tecidos ( $\mu\text{g/g}$ ) em pacientes adultos sadios do sexo masculino			
Tecido ou Fluido	Dose IV	Tempo médio da amostra após a dose (h)	Concentração média
Urina	500mg	0-4	292
	1g	0-4	926
	2g	0-4	3120
Bile	2g	9,4	17,8
Fluido Peritoneal	2g	4,4	18,3
Fluido Pustular	2g	1,5	81,4
Mucosa Brônquica	2g	4,8	24,1
Escarro	2g	4	7,4
Próstata	2g	1	31,5
Apêndice	2g	5,7	5,2
Vesícula Biliar	2g	8,9	11,9

**Metabolismo:** a cefepima é metabolizada à N-metilpirrolidina, que é rapidamente convertida a N-óxido. A recuperação urinária da cefepima inalterada representa aproximadamente 85% da dose administrada; altas concentrações de cefepima inalterada são encontradas na urina. Menos de 1% da dose administrada é recuperada da urina como N-metilpirrolidina, 6,8% como N-óxido e 2,5% como um epímero da cefepima.

**Eliminação:** a meia-vida média de eliminação da cefepima é de aproximadamente 2 horas e não varia com relação à dose entre 250mg a 2g. Não houve acúmulo em indivíduos sadios recebendo doses de até 2g IV a cada 8 horas por um período de 9 dias. O *clearance* corpóreo total médio é de 120mL/min. O *clearance* renal médio da cefepima é de 110mL/min, sugerindo que a cefepima é eliminada quase que exclusivamente por mecanismos renais, principalmente por filtração glomerular.

**Populações Especiais:** Foi demonstrada melhora clínica com o uso do Clocef® no tratamento da exacerbão de infecções pulmonares agudas em pacientes com fibrose cística (N=24, média de idade de 15 anos, variando de 5 a 47 anos de idade). A terapia antibacteriana pode não alcançar a erradicação bacteriológica nesta população de pacientes. Não foram observadas alterações clinicamente relevantes na farmacocinética da cefepima em pacientes com fibrose cística.

**Insuficiência Renal:** em pacientes com vários graus de insuficiência renal, a meia-vida de eliminação é prolongada, apresentando uma relação linear entre o *clearance* corpóreo total e o *clearance* da creatinina. Isto serve como base para recomendações de ajuste de dose neste grupo de pacientes. A meia-vida média em pacientes com disfunção grave, que necessitam de diálise, é de 13 horas para hemodiálise e de 19 horas para diálise peritoneal contínua de ambulatório.

**Insuficiência Hepática:** a farmacocinética da cefepima permaneceu inalterada em pacientes com disfunção hepática que receberam dose única de 1g. Não é necessário alterar a dose do Clocef® nesta população de pacientes.

**Pacientes Idosos:** constatou-se que voluntários sadios com 65 anos de idade, ou mais, que receberam dose única de 1g IV de cefepima, tiveram valores de área sob a curva (AUC) maiores e valores de *clearance* renal menores, quando comparados a pacientes mais jovens. O ajuste de dose em pacientes idosos é recomendado se a função renal estiver comprometida.

**Crianças e Adolescentes:** a farmacocinética da cefepima em doses múltiplas e em dose única foi avaliada em pacientes com idades entre 2,1 meses a 11,2 anos que receberam doses de 50mg/kg administradas por infusão IV ou injeção IM; doses múltiplas foram administradas a cada 8 ou 12 horas durante pelo menos 48 horas.

Após dose única IV, a média do *clearance* corpóreo total foi de 3,3mL/min/kg e o volume médio de distribuição foi de 0,3L/kg. A meia-vida média de eliminação foi de 1,7 horas. A recuperação urinária média da cefepima inalterada foi de 60,4% da dose administrada e o *clearance* renal foi a principal via de eliminação com média de 2,0mL/min/kg.

Após múltiplas doses IV, as concentrações plasmáticas médias de cefepima no estado de equilíbrio foram similares às concentrações após a primeira dose, com discreto acúmulo após repetidas doses.

Outros parâmetros farmacocinéticos em lactentes e crianças não foram diferentes entre a primeira dose e determinações em estado de equilíbrio, independentemente do intervalo entre as doses (a cada 8 ou 12 horas). Também não houve diferenças farmacocinéticas entre os pacientes de diferentes idades ou entre pacientes do sexo masculino e feminino.

Após injeção IM em estado de equilíbrio, a concentração plasmática média de 68 $\mu$ g /mL foi obtida depois de 0,75 hora. A média da concentração mínima, após injeção IM em estado de equilíbrio foi de 6,0 $\mu$ g/mL em 8 horas. A biodisponibilidade média foi de 82% após injeção IM.

Concentrações de cefepima no líquido cefalorraquidiano e plasmático são apresentadas na Tabela 5:

Tabela 5 Média (desvio padrão – DP) das concentrações no líquido cefalorraquidiano (LCR) e plasmático (PL), e índice LCR/PL da cefepima em lactentes e crianças.*				
Horário da Coleta (h)	N	Concentração Plasmática ( $\mu$ g/mL)	Concentração no LCR ( $\mu$ g/mL)	Índice LCR/PL
0,5	7	67,1 (51,2)	5,7 (7,3)	0,12 (0,14)
1	4	44,1 (7,8)	4,3 (1,5)	0,10 (0,04)
2	5	23,9 (12,9)	3,6 (2,0)	0,17 (0,09)
4	5	11,7 (15,7)	4,2 (1,1)	0,87 (0,56)
8	5	4,9 (5,9)	3,3 (2,8)	1,02 (0,64)

\* Pacientes com idades entre 3,1 meses a 12 anos, com média de idade (DP) de 2,6 (3,0) anos. Pacientes com suspeita de infecção no Sistema Nervoso Central (SNC) foram tratados com cefepima, 50mg/kg, administrada por infusão IV de 5 a 20 minutos a cada 8 horas. Amostras de sangue e de LCR foram coletadas de pacientes selecionados, aproximadamente em 0,5, 1, 2, 4 e 8 horas após o final da infusão no 2º ou 3º dia de terapia com a cefepima.

**Outros:** a farmacocinética da cefepima não mudou em um grau clinicamente significativo em pacientes com fibrose cística. Não é necessário ajustar a dose de cefepima nesta população de pacientes.

#### Propriedades Farmacodinâmicas

**Microbiologia:** a cefepima é um agente bactericida que age por inibição da síntese da parede celular bacteriana. A cefepima tem amplo espectro de atividade contra uma grande variedade de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo a maioria das cepas resistentes aos aminoglicosídeos ou às cefalosporinas de terceira geração. A cefepima é altamente resistente à hidrólise pela maioria das betalactamases e tem baixa afinidade por betalactamases cromossomicamente codificadas, exibindo rápida penetração nas células bacterianas Gram- negativas.

Em estudos usando *Escherichia coli* e *Enterobacter cloacae*, a cefepima demonstrou máxima afinidade pela proteína de ligação à penicilina (PLP) 3, seguida pela PLP 2 e, então, pelas PLP's 1a e 1b. A ligação à PLP 2 ocorre com afinidade significantemente mais alta do que com outras cefalosporinas parenterais, o que pode aumentar sua atividade antibacteriana. A afinidade moderada da cefepima pelas PLP's 1a e 1b provavelmente também contribui para sua atividade bactericida total.

A cefepima mostrou-se bactericida pela análise da relação tempo-inibição (curva de inibição) e pela determinação das concentrações bactericidas mínimas (CBM) para uma ampla variedade de bactérias. O índice CBM/CIM (concentrações bactericidas mínimas / concentração inibitória mínima) não foi maior que 2 para a maioria (mais de 80%) dos isolados de todas as espécies Gram-positivas e Gram-negativas analisadas.

Foi demonstrado sinergismo com os aminoglicosídeos *in vitro*, principalmente com isolados de *Pseudomonas aeruginosa*.

A cefepima mostrou-se ativa contra a maioria das cepas dos seguintes microrganismos:

Gram-positivos aeróbios:

*Staphylococcus aureus* (incluindo cepas produtoras de betalactamase)

*Staphylococcus epidermidis* (incluindo cepas produtoras de betalactamase)

Outros estafilococos entre os quais *S. hominis* e *S. saprophyticus*

*Streptococcus pyogenes* (estreptococos do Grupo A)

*Streptococcus agalactiae* (estreptococos do Grupo B)

*Streptococcus pneumoniae* (incluindo cepas de resistência intermediária à penicilina com CIM de 0,1 a 1 µg/mL)

Outros estreptococos beta-hemolíticos (Grupos C, G, F), *S. bovis* (Grupo D) e estreptococos *Viridans*.

NOTA: A maioria das cepas de enterococos, por exemplo *Enterococcus faecalis*, e estafilococos resistentes à meticilina, são resistentes à maioria das cefalosporinas, inclusive à cefepima.

Gram-negativos aeróbios:

*Aeromonas hydrophila*

*Capnocytophaga* sp.

*Citrobacter* sp., entre os quais *C. diversus* e *C. freundii*

*Campylobacter jejuni*

*Enterobacter* sp., entre os quais *E. cloacae*, *E. aerogenes* e *E. sakazakii*

*Escherichia coli*

*Gardnerella vaginalis*

*Haemophilus ducreyi*, *Haemophilus influenzae* (incluindo cepas produtoras de betalactamase)

*Haemophilus parainfluenzae*

*Hafnia alvei*

*Klebsiella* sp., entre os quais *K. pneumoniae*, *K. oxytoca* e *K. ozaenae*

*Morganella morganii*

*Moraxella catarrhalis* (*Branhamella catarrhalis*) (incluindo cepas produtoras de betalactamase)

*Neisseria gonorrhoeae* (incluindo cepas produtoras de betalactamase)

*Neisseria meningitidis*

*Pantoea agglomerans* (anteriormente conhecido como *Enterobacter agglomerans*)

*Proteus* sp., entre os quais *P. mirabilis* e *P. vulgaris*

*Providencia* sp., entre os quais *P. rettgeri* e *P. stuartii*

*Pseudomonas* sp., entre os quais *P. aeruginosa*, *P. putida* e *P. stutzeri*

*Salmonella* sp.,

*Serratia*, entre os quais *S. marcescens* e *S. liquefaciens*

*Shigella* sp.

*Yersinia enterocolitica*.

NOTA: a cefepima é inativa contra muitas cepas de *Stenotrophomonas maltophilia* (anteriormente conhecida como *Xanthomonas maltophilia* e *Pseudomonas maltophilia*) e *Acinetobacter* sp.

Anaeróbios:

*Bacteroides* sp.

*Clostridium perfringens*

*Fusobacterium* sp.

*Mobiluncus* sp.

*Peptostreptococcus* sp.

*Prevotella melaninogenica* (anteriormente conhecida como *Bacteroides melaninogenicus*)

*Veillonella* sp.

NOTA: a cefepima é inativa contra *Bacteroides fragilis* e *Clostridium difficile*.

A prevalência de resistência adquirida pode variar geograficamente e com o tempo para espécies selecionadas. Informação sobre o padrão de resistência local deve ser obtida de um laboratório bacteriológico local e considerada na escolha da terapia empírica.

#### Testes de sensibilidade

Técnicas de Difusão: resultados laboratoriais de testes de sensibilidade com disco único padronizado, usando-se discos de 30 $\mu$ g de cefepima, conforme determinação do National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), devem ser interpretados de acordo com o seguinte critério:

Microrganismo	Diâmetro do halo (mm)		
	Suscetível (S)	Intermediário (I)	Resistente (R)
<i>Microrganismos que não sejam Haemophilus</i> sp.* e <i>S. pneumoniae</i> .*	$\geq 18$	15-17	$\leq 14$
<i>Haemophilus</i> sp.*	$\geq 26$	-*	-*

\* NOTA: Isolados destas espécies devem ser testados quanto à sensibilidade usando métodos de teste especializados. Isolados de *Haemophilus* sp. com halos <26 mm devem ser considerados equivocados e devem ser avaliados adicionalmente. Isolados de *S. pneumoniae* devem ser testados novamente contra um disco de 1 $\mu$ g de oxacilina; isolados com halos de oxacilina  $\geq 20$  mm podem ser considerados sensíveis à cefepima.

“Suscetível” indica que o patógeno é, provavelmente, inibido por concentrações plasmáticas que são geralmente alcançadas.

“Intermediário” indica que o organismo é suscetível quando altas doses são usadas ou quando a infecção está confinada a tecidos e fluidos (p. ex.: fluido intersticial e urina), nos quais altos níveis de antibióticos são atingidos.

“Resistente” indica que é improvável que a concentração alcançável de antibiótico seja inibitória e outra terapia deve ser instituída.

A sensibilidade dos microrganismos deve ser avaliada com discos de cefepima, porque esta tem-se mostrado ativa *in vitro* contra certas cepas resistentes a outros discos de betalactamase. O disco de cefepima não deve ser utilizado para avaliar a sensibilidade frente a outras cefalosporinas. Procedimentos padronizados de controle de qualidade preconizam o uso de cepas controle.

**Técnicas de Diluição:** usando-se métodos padronizados de diluição ou equivalentes (ex.: E-test®), os valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) obtidos devem ser interpretados de acordo com o seguinte critério:

CIM (2 $\mu$ g/mL)			
Microrganismo	Suscetível (S)	Intermediário (I)	Resistente (R)
<i>Microrganismos que não sejam Haemophilus</i> sp.* e <i>S. pneumoniae</i> .*	$\leq 8$	16	$\geq 32$
<i>Haemophilus</i> sp.*	$\leq 2$	-*	-*
<i>Streptococcus pneumoniae</i> *	$\leq 0.5$	1*	$\geq 2$

\* NOTA: isolados destas espécies devem ser testados quanto à sensibilidade usando métodos de testes de diluição especializados. Cepas de *Haemophilus* sp. com CIM's

maiores que 2 $\mu$ g/mL devem ser consideradas equivocadas e devem ser avaliadas adicionalmente. Se o isolado de *S. pneumoniae* não for recuperado de um paciente com meningite, cepas de pneumococos com CIM's intermediárias podem responder à terapia com cefepima.

Assim como as técnicas de difusão, as técnicas de diluição preconizam o uso de cepas controle.

#### **4. CONTRAINDICAÇÕES**

Clocef® é contraindicado para uso por pacientes que tenham demonstrado reações prévias de hipersensibilidade a algum componente da formulação, a antibióticos da classe das cefalosporinas, a penicilinas ou a outros antibióticos betalactâmicos.

#### **5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Em pacientes com disfunção renal, como a redução do débito urinário por causa de insuficiência renal (*clearance* da creatinina  $\leq$  50mL/min) ou outras condições que possam comprometer a função renal, a dose do Clocef® deve ser ajustada para compensar o índice menor de eliminação renal. Como concentrações séricas altas e prolongadas de antibióticos podem ocorrer com doses usuais em pacientes com disfunção renal ou outras condições que podem comprometer a função renal, a dose de manutenção deve ser reduzida quando cefepima é administrada em tais pacientes. Doses contínuas devem ser determinadas pelo grau da disfunção renal, gravidade da infecção e sensibilidade dos agentes patógenos.

Experiência pós-comercialização, os seguintes eventos adversos sérios foram reportados: encefalopatia reversível (distúrbios de consciência incluindo confusão, alucinações, torpor e coma), mioclonia, convulsões (incluindo estado epiléptico não convulsivo), e/ou falência renal. A maioria dos casos ocorreu em pacientes com disfunção renal que receberam doses de cefepima que excederam as recomendações. Em geral, sintomas neurotóxicos foram resolvidos após a descontinuação de cefepima e/ou após a hemodiálise, entretanto, alguns destes casos tiveram efeito fatal.

Os antibióticos devem ser administrados com cautela a qualquer paciente que tenha demonstrado alguma forma de alergia, principalmente a medicamentos. Se ocorrer reação alérgica com Clocef®, descontinuar o medicamento e tratar o paciente adequadamente. Reações graves de hipersensibilidade podem exigir a administração de epinefrina ou outra terapia de suporte.

Como ocorre com outros antibióticos, o uso do Clocef® pode resultar em supercrescimento de organismos não sensíveis. Na ocorrência de superinfecção durante a terapia, devem ser tomadas medidas apropriadas.

Diarreia associada a *Clostridium difficile* (Dacd) foi descrita com o uso de praticamente todos os agentes antibacterianos, incluindo Clocef®, e pode variar quanto ao grau de gravidade, desde diarreia leve até colite fatal. Dacd deve ser considerada em todos os pacientes que apresentem diarreia após o uso do antibiótico. É necessário cuidado com o histórico médico, já que foi reportada a ocorrência de dacd até dois meses depois da administração de agentes antibacterianos. Se há suspeita ou confirmação de dacd, o uso contínuo de antibióticos que não ajam diretamente contra *C. difficile* poderá ter de ser descontinuado.

A função renal deve ser cuidadosamente monitorada se medicamentos com potencialmente nefrotóxico, como aminoglicosídeos e diuréticos potentes, forem administrados concomitante ao Clocef®.

Antes que a terapia com Clocef® seja instituída, deve ser feita uma análise cuidadosa para determinar se o paciente teve reações imediatas de hipersensibilidade prévias a cefepima, cefalosporinas, penicilinas, ou outras drogas. Se o produto for prescrito a pacientes sensíveis a penicilinas, deve-se fazê-lo com cautela, pois foi relatada hipersensibilidade cruzada com antibióticos betalactâmicos que pode ocorrer em até de 10% dos pacientes com histórico de alergia a penicilina. Se uma reação alérgica ao Clocef® ocorrer, o tratamento com este medicamento deve ser descontinuado. Reações sérias de hipersensibilidade aguda podem necessitar de tratamento com epinefrina e outras medidas de emergências, incluindo oxigênio, corticosteroides, fluidos intravenosos, anti-histamínicos intravenosos, aminopressores, e monitoração das vias aéreas, indicados clinicamente.

**Efeitos na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas:** o efeito do Clocef® sobre pacientes dirigindo veículos ou operando máquinas não foi estudado. No entanto, possíveis reações adversas como alteração do estado de consciência, tontura, estado de confusão ou alucinação podem afetar a habilidade de dirigir e operar máquinas.

**Carcinogênese, Mutagênese e Comprometimento da Fertilidade:** nenhum estudo prolongado em animais foi conduzido para se avaliar o potencial carcinogênico. Os testes *in vitro* e *in vivo* para genotoxicidade mostraram que cefepima não é genotóxica. Não foi observado comprometimento da fertilidade em ratos.

**Gravidez:** estudos de reprodução em camundongos, ratos e coelhos não mostraram evidências de dano fetal; no entanto, não há estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas. Pelo fato de os estudos de reprodução em animais não serem sempre preeditivos da resposta humana, esta droga deverá ser usada durante a gravidez somente se claramente necessário.

**Categoria de risco na gravidez: B**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Lactação:** a cefepima é excretada no leite humano em concentrações muito baixas. A administração de cefepima deve ser feita com muita cautela a lactantes.

**Uso em Idosos, crianças e outros grupos de risco**

**Uso pediátrico:** a segurança do Clocef® em lactentes e crianças é similar à observada em adultos.

**Uso geriátrico:** dos mais de 6400 adultos tratados com cefepima em estudos clínicos, 35% tinham 65 anos de idade ou mais, enquanto 16% tinham 75 anos de idade ou mais.

Nos estudos clínicos, os pacientes geriátricos que receberam a dose comumente recomendada para adultos mostraram eficácia clínica e segurança comparáveis à eficácia clínica e segurança em pacientes adultos não geriátricos, a não ser que estes pacientes tivessem insuficiência renal. Houve discreto aumento da meia-vida de eliminação e menor valor do *clearance* renal, quando comparados com os de pessoas mais jovens. Ajustes de dose são recomendados se a função renal estiver comprometida.

Sabe-se que a cefepima é substancialmente excretada pelos rins e o risco de reações tóxicas a esta droga pode ser maior em pacientes com função renal prejudicada. Como os pacientes geriátricos têm maior probabilidade de terem função renal diminuída, cuidados devem ser tomados na escolha da dose e a função renal deve ser monitorada. Eventos adversos sérios, incluindo encefalopatia reversível (distúrbios de consciência incluindo confusão, alucinações, torpor e coma), mioclonia, convulsões (incluindo estado epiléptico não

convulsivo) e/ou insuficiência renal ocorreram em pacientes geriátricos com insuficiência renal com doses usuais de cefepima.

## 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A função renal deve ser cuidadosamente monitorada se altas doses de aminoglicosídeos (como, por exemplo, a amicacina e a gentamicina) forem administradas com Clocef®, devido ao aumento do potencial nefrotóxico e ototóxico dos antibióticos aminoglicosídeos. Foi relatada nefrotoxicidade após administração concomitante de outras cefalosporinas com diuréticos potentes como a furosemida.

**Interações em Exames Laboratoriais:** pode ocorrer reação falso-positiva para glicose na urina com os testes de redução de cobre (Benedict, solução de *Fehling* ou comprimidos Clinitest®), mas não com os testes enzimáticos para glicosúria (p. ex.: Clinistix®).

## 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

ANTES DA RECONSTITUIÇÃO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Este medicamento tem prazo de validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Atenção: O número de lote e data de validade gravados no frasco-ampola podem se tornar ilegíveis ou até serem perdidos caso a embalagem entre em contato com algum tipo de solução alcoólica.

Após preparo, manter Clocef® por período, conforme descrito do tópico **(8. POSOLOGIA E MODO DE USAR – Diluição antes da administração e estabilidade da solução)**.

**Características Físicas:** O Clocef® é um pó branco a amarelo claro. Solução após reconstituição, incolor a âmbar.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Clocef® pode ser administrado por via intramuscular ou intravenosa.

### Preparação das soluções e administração

Preparação das soluções e administração: Antes da reconstituição agite o frasco-ampola ainda fechado para soltar o pó do fundo, com batidas leves e injete o diluente em turbilhão no interior do frasco-ampola para propiciar uma homogeneização mais efetiva. Clocef® pó deve ser reconstituído utilizando-se os volumes de diluentes descritos na Tabela 6; os diluentes a serem utilizados são identificados após a tabela a seguir.

**Tabela 6**  
**Preparo das soluções do Clocef®**

Dose Única para Administração (frasco-ampola)	Volume de diluente a ser adicionado (mL)	Volume final aproximado após preparo (mL)	Concentração aproximada de cefepima (mg/mL)
Intravenosa			
1g	10	11,4	90

<b>2g</b>	10	12,8	160
<b>Intramuscular</b>			
<b>1g</b>	3	4,4	230

#### **Administração intravenosa (IV)**

É a via de administração preferencial para pacientes com infecções graves ou com risco de morte, principalmente se existe a possibilidade de choque.

Para a administração IV **direta**, reconstituir Clocef® com água estéril para injeção, solução injetável de glicose a 5% ou solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, utilizando-se os volumes de diluente descritos na Tabela 6. A solução resultante deve ser injetada diretamente na veia por período de três a cinco minutos ou injetada no tubo do equipo de administração, enquanto o paciente estiver recebendo líquido intravenoso compatível.

Para **infusão** IV, reconstituir a dose de 1g ou 2g, como descrito anteriormente para administração IV direta e adicionar a quantidade apropriada da solução resultante em um recipiente adequado com um dos líquidos intravenosos compatíveis. A solução resultante deve ser administrada por um período de aproximadamente 30 minutos.

#### **Administração intramuscular (IM)**

Clocef® deve ser reconstituído com um dos seguintes diluentes (utilizando-se os volumes descritos na **Tabela 6**): água estéril para injeção, solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável de glicose a 5% ou água bacteriostática para injeção com parabenos ou álcool benzílico e administrado por injeção IM profunda em uma grande massa muscular (como o quadrante superior externo da região glútea).

Em um estudo farmacocinético, doses de até 1 g (volume < 3,1mL) foram administradas em local único; a dose máxima IM (2g / 6,2mL) foi administrada em dois locais. Embora o Clocef® possa ser reconstituído com cloridrato de lidocaína a 0,5 ou 1,0%, esta normalmente não é necessária, pois Clocef® causa pouca ou nenhuma dor na administração IM.

#### **Diluição antes da Administração e Estabilidade da Solução**

##### **• Administração Intravenosa**

Clocef® é compatível em concentrações entre 1 e 40mg/mL com os seguintes líquidos para infusão IV: solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável de glicose a 5% ou 10%, injeção de lactato de sódio M/6, solução injetável de glicose a 5% e solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável de Ringer Lactato e solução injetável de glicose a 5%. Estas soluções são estáveis por 24 horas à temperatura ambiente controlada (20-25°C) ou por 7 dias sob refrigeração (entre 2°C e 8°C).

Informações sobre a estabilidade e compatibilidade do Clocef® em associações estão resumidas na Tabela 7:

<b>Tabela 7</b> <b>Estabilidade da cefepima em associações</b>				
			<b>Tempo de Estabilidade</b>	
<b>Concentração do Clocef®</b>	<b>Droga Associada e Concentração</b>	<b>Solução para Infusão IV</b>	<b>Temp. Ambiente (20°C-25°C) e iluminação.</b>	<b>Refrigeração</b>
40mg/mL	<u>Amicacina</u> 6mg/mL	SF ou SG5%	24 horas	7 dias

40mg/mL	Ampicilina 1mg/mL	SG5%	8 horas	8 horas
40mg/mL	Ampicilina 10mg/mL	SG5%	2 horas	8 horas
40mg/mL	Ampicilina 1mg/mL	SF	24 horas	48 horas
40mg/mL	Ampicilina 10mg/mL	SF	8 horas	48 horas
4mg/mL	Ampicilina 40mg/mL	SF	8 horas	8 horas
4-40mg/mL	<u>Clindamicina</u> 0,25-6mg/mL	SF ou SG5%	24 horas	7 dias
4mg/mL	<u>Heparina</u> 10-50 unidades/mL	SF ou SG5%	24 horas	7 dias
4mg/mL	Cloreto de potássio 10-40 mEq/L	SF ou SG5%	24 horas	7 dias
4mg/mL	<u>Teofilina</u> 0,8 mg/mL	SG5%	24 horas	7 dias
1-4mg/mL	NA	Solução para nutrição parenteral <sup>a</sup>	8 horas	3 dias
0,125-0,25 mg/mL	NA	Solução para diálise peritoneal <sup>b</sup>	24 horas à temp. ambiente e iluminação	7 dias

<sup>a</sup> = Aminosina® II 4,25% em glicose 25% com eletrólitos e cálcio.

<sup>b</sup> = Inpersol® com 4,25% de glicose.

SF = Solução injetável de cloreto de sódio a 0,9% para injeção.

SG5% = Solução injetável de glicose a 5%

NA = não aplicável

#### • Administração Intramuscular

Clocef® reconstituído para uso intramuscular conforme descrito na Tabela 6 é compatível e estável por 24 horas à temperatura ambiente controlada (20 °C a 25 °C) ou por 7 dias sob refrigeração (2 °C a 8 °C) quando são usados os seguintes diluentes: água estéril para injeção, solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável de glicose a 5%, água bacteriostática para injeção com parabenos ou álcool benzílico, ou cloridrato de lidocaína a 0,5% ou 1,0%.

**NOTA:** Os medicamentos de uso parenteral devem ser visualmente inspecionados antes da administração com relação a materiais estranhos, e não devem ser utilizados se estiverem presentes.

Como ocorre com outras cefalosporinas, a cor do Clocef® pó e da solução reconstituída pode escurecer durante a armazenagem, porém a potência do produto permanece inalterada.

**Compatibilidade:** as soluções do Clocef®, assim como a maioria dos antibióticos betalactâmicos, não devem ser associadas com soluções de metronidazol, vancomicina, gentamicina, sulfato de tobramicina ou sulfato de netilmicina, devido à incompatibilidade

física e química. Entretanto, caso a terapia concomitante com Clocef® seja indicada, cada um desses antibióticos poderá ser administrado separadamente.

**Posologia:** clocef® pode ser administrado por via intravenosa ou por via intramuscular. A dose e a via de administração variam de acordo com a gravidade da infecção, com a função renal e com a condição geral do paciente.

**Adultos e Pacientes Pediátricos com peso corpóreo superior a 40kg:** um guia para as doses do Clocef® em adultos e pacientes pediátricos com peso corpóreo superior a 40kg com função renal normal é apresentado na Tabela 8.

<b>TABELA 8</b> <b>Esquema de Dosagem Recomendada para Adultos e Pacientes Pediátricos com peso corpóreo superior a 40 kg com Função Renal Normal*</b>		
<b>Gravidade da Infecção</b>	<b>Dose e Via de Administração</b>	<b>Intervalo da dose</b>
Infecções leves a moderadas do trato urinário.	500 mg a 1g (IV ou IM)	A cada 12 horas
Outras infecções leves a moderadas, diferentes das infecções do trato urinário.	1g (IV ou IM)	A cada 12 horas
Infecções graves	2g (IV)	A cada 12 horas
Infecções muito graves ou com risco de morte.	2g (IV)	A cada 8 horas

\* A duração normal do tratamento é de 7 a 10 dias; porém, infecções mais graves podem necessitar de tratamento mais prolongado. Para o tratamento empírico de neutropenia febril, a duração usual da terapia deve ser de pelo menos 7 dias ou até a resolução da neutropenia.

**Profilaxia Cirúrgica (Adultos):** a dose recomendada para a profilaxia de infecções em pacientes submetidos à cirurgia de cólon e reto segue abaixo:

Uma dose única de 2g IV do Clocef® (infusão com duração de 30 min) iniciando 60 min antes da incisão cirúrgica inicial. Uma dose única de 500mg IV de metronidazol deve ser administrada imediatamente após o término da infusão do Clocef®. O metronidazol deve ser preparado e administrado de acordo com a bula oficial do produto. Devido à incompatibilidade, Clocef® e metronidazol não devem ser misturados no mesmo recipiente; recomenda-se enxaguar o equipo de administração intravenosa com um líquido compatível antes da infusão do metronidazol.

Caso o procedimento cirúrgico se prolongue por mais de 12 horas a partir da dose profilática inicial, uma segunda dose do Clocef® seguida por metronidazol deve ser administrada 12 horas após a dose profilática inicial.

**Pacientes pediátricos com função renal normal:** Doses comumente recomendadas: pneumonia, infecções do trato urinário, infecções da pele e estruturas cutâneas: pacientes pediátricos com mais de 2 meses de idade e peso corpóreo inferior ou igual a 40kg: 50mg/kg a cada 12 horas durante 10 dias. Para infecções mais graves pode ser usado um intervalo de 8 horas entre as doses.

Septicemia, meningite bacteriana e tratamento empírico da neutropenia febril: pacientes pediátricos com mais de 2 meses de idade e peso corpóreo inferior ou igual a 40kg: 50mg/kg a cada 8 horas durante 7 – 10 dias.

A experiência com o uso do Clocef® em pacientes pediátricos com menos de 2 meses de idade é limitada.

Embora esta experiência tenha sido alcançada usando-se a dose de 50mg/kg, os dados farmacocinéticos obtidos em pacientes com mais de 2 meses de idade sugerem que a dose de 30mg/kg a cada 8 ou 12 horas pode ser considerada para pacientes entre 1 e 2 meses de idade. As doses de 50mg/kg para pacientes com mais de 2 meses de idade e de 30mg/kg para pacientes entre 1 e 2 meses de idades são comparáveis à dose de 2g para adultos. A administração do Clocef® nestes pacientes deverá ser cuidadosamente monitorada.

Para pacientes pediátricos com peso corpóreo acima de 40kg, aplicam-se às doses recomendadas para adultos. A dose recomendada para pacientes pediátricos não deve exceder a dose máxima recomendada para adultos (2g a cada 8 horas). A experiência com a administração intramuscular em pacientes pediátricos é limitada.

**Pacientes com disfunção renal:** em pacientes com disfunção renal, a dose de cefepima deve ser ajustada para compensar o índice menor de eliminação renal. A dose inicial recomendada de cefepima em pacientes com insuficiência renal leve a moderada deve ser a mesma que em pacientes com função renal normal. As doses de manutenção recomendadas de cefepima em pacientes adultos com insuficiência renal estão presentes na Tabela 9.

Quando somente a medida da creatinina sérica está disponível, a seguinte fórmula (equação de Cockcroft e Gault) pode ser usada para estimar o *clearance* da creatinina. A creatinina sérica deve representar uma condição normal da função renal:

Homens: *clearance* da creatinina (mL/min) = peso (kg) x (140-idade) / 72 x creatinina sérica (mg/dL)

Mulheres: 0,85 x valor calculado usando a fórmula para homens.

**Tabela 9**

Esquema de doses de manutenção recomendada em pacientes adultos com disfunção renal*				
Clearance de creatinina (mL/min)	DOSE DE MANUTENÇÃO RECOMENDADA (Dose usual, sem ajuste necessário)			
>50	2g a cada 8 horas	2g a cada 12 horas	1g a cada 12 horas	500mg a cada 12 horas
30-50	2g a cada 12 horas	2g a cada 24 horas	1g a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas
11-29	2g a cada 24 horas	1g a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas
≤ 10	1g a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas	250mg a cada 24 horas	250mg a cada 24 horas
Hemodiálise*	500mg a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas	500mg a cada 24 horas

\*O modelo farmacocinético indica que a redução de dose é necessária para estes pacientes. Para pacientes que estão submetidos à hemodiálise e concomitantemente recebendo cefepima, a dose de cefepima deve ser como segue: 1g de cefepima como dose de ataque no primeiro dia de tratamento e 500 mg por dia a partir do 2º dia para todas as infecções exceto neutropenia febril, para a qual a dose é de 1g por dia.

Nos dias de diálise, cefepima deve ser administrada após a diálise. Sempre que possível cefepima deve ser administrada na mesma hora a cada dia.

**Pacientes submetidos à diálise:** em pacientes submetidos à hemodiálise, aproximadamente 68% da quantidade total de cefepima presente no organismo no início da diálise será removida durante um período de 3 horas de diálise. Em pacientes submetidos à diálise peritoneal contínua em ambulatório, a cefepima pode ser administrada nas mesmas doses recomendadas para pacientes com função renal normal, isto é, 500mg, 1g ou 2g, dependendo da gravidade da infecção, porém com intervalo entre as doses de 48 horas.

**Pacientes pediátricos com disfunção renal:** uma vez que a excreção urinária é a principal via de eliminação da cefepima em pacientes pediátricos, o ajuste das doses do Clocef® deve ser considerado nesta população.

Como recomendado anteriormente na Tabela 9, os mesmos aumentos nos intervalos entre doses e/ou reduções de doses devem ser usados. Quando somente o valor da creatinina sérica estiver disponível, o *clearance* de creatinina pode ser estimado utilizando-se um dos seguintes métodos:

**clearance de creatinina (mL/min/1,73m<sup>2</sup>) = (0,55 X altura (centímetros) / creatinina sérica (mg/dL))**

**OU**

**clearance de creatinina (mL/min/1,73m<sup>2</sup>) = (0,52 X altura (centímetros) / creatinina sérica (mg/dL)) – 3,6**

**Disfunção hepática:** não é necessário ajuste de dose para pacientes com alterações da função hepática.

Para segurança e eficácia desta apresentação, Clocef® injetável não deve ser administrado por vias não recomendadas. A administração deve ser somente pela via intravenosa ou intramuscular.

## **9. REAÇÕES ADVERSAS**

Os seguintes eventos adversos e alterações em testes laboratoriais foram relatados para os antibióticos da classe das cefalosporinas: síndrome de *Stevens-Johnson*, eritema multiforme, necrólise epidérmica tóxica, nefropatia tóxica, anemia aplásica, anemia hemolítica, hemorragia e testes falsopositivo para glicose na urina.

**Experiência clínica:** em estudos clínicos (=5598), os eventos adversos mais comuns foram sintomas gastrintestinais e as reações de hipersensibilidade. Eventos adversos em relação ao Clocef® estão relacionados a seguir.

Reações Adversas Comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

-Reações no local da administração da infusão IV ocorreram em 5,2% dos pacientes; estas reações incluíram flebite (2,9%);

-A administração intramuscular do Clocef® foi muito bem tolerada; apenas 2,6% dos pacientes apresentaram dor ou inflamação no local da aplicação;

-Erupções da pele (1,8%);

-Diarreia (1,2%).

Reações Adversas Incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento):

-Hipersensibilidade: prurido, urticária;

-Gastrintestinais: náuseas, vômitos, candidíase oral, colite (inclusive colite pseudomembranosa);

-Sistema nervoso central: cefaleia;

-Outros: febre, vaginite, eritema.

Reações Adversas Raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento):

Dor abdominal, constipação, vasodilatação, dispneia, tontura, inflamação no local da infusão IV (0,1%), parestesia, prurido genital, alteração de paladar, calafrios e candidíase inespecífica.

Eventos de significância clínica que ocorreram com incidência muito rara (inferior a 0,05%) incluem anafilaxia e convulsões.

O perfil de segurança do Clocef® em crianças e lactentes é similar ao dos adultos.

**Exames Laboratoriais:** as anormalidades nos testes laboratoriais que ocorreram durante estudos clínicos em pacientes com valores basais normais foram transitórias. Aqueles que ocorreram com uma frequência entre 1% e 2% foram:

elevações na alanina aminotransferase (3,6%), aspartato aminotransferase (2,5%), fosfatase alcalina, bilirrubina total, anemia, eosinofilia, tempo de protrombina prolongado, tempo de tromboplastina parcial (2,8%) e teste de *Coombs* positivo sem hemólise (18,7%). Elevações transitórias de nitrogênio ureico plasmático e/ou creatinina sérica e trombocitopenia transitória foram observadas em 0,5% a 1% dos pacientes. Leucopenia transitória e neutropenia também foram constatadas (<0,5%).

**Experiência de pós-comercialização – Farmacovigilância:** em adição aos eventos relatados durante os estudos clínicos na América do Norte com cefepima, os seguintes eventos adversos foram relatados durante a experiência de comercialização em todo o mundo.

Assim como outras drogas desta classe, foram relatados encefalopatia (reação adversa grave, consiste em distúrbios de consciência incluindo confusão, alucinação, torpor e coma), convulsões, mioclonia, e/ou falência renal. A maioria dos casos ocorreu em pacientes com disfunção renal que receberam doses de cefepima que excederam as recomendações.

Assim como outras cefalosporinas, foram relatadas reações anafiláticas, incluindo choque anafilático, leucopenia transitória, neutropenia, agranulocitose e trombocitopenia.

**Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm](http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.**

## **10. SUPERDOSE**

Superdose accidental ocorreu quando grandes doses foram administradas a pacientes com insuficiência renal. Sintomas de superdose incluem: encefalopatia (distúrbio de consciência, incluindo confusão, alucinações, torpor e coma) mioclonia e convulsões.

No caso de superdose grave, especialmente em pacientes com a função renal comprometida, a hemodiálise ajudará na remoção da cefepima do organismo; diálise peritoneal não é indicada nestes casos.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **REFERÊNCIAS**

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically - Third Edition . Approved Standards NCCLS Document M7-A3, Vol. 13, nº 25, NCCLS, Villanova, PA, December, 1993.
2. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance Standards for Antimicrobial Disk susceptibility Tests - Fifty Edition. Approved Standards NCCLS Document M2-A5, Vol. 13, nº 24, NCCLS, Villanova, PA, December, 1993.
3. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron., 16:31-41, 1976.
4. BMS Study AI411-230. A multicenter open randomized comparative evaluation of the efficacy and safety of cefepime and ceftriaxone in the prophylaxis of bacterial infections in colorectal surgery. Document Accession No.910071138.
5. Expert Report for BMS Study AI411-230. A multicenter open randomized comparative evaluation of the efficacy and safety of cefepime and ceftriaxone in the prophylaxis of bacterial infections in colorectal surgery. Document Accession No.910071185.
6. FDA Summary Basis of Approval, Joint Clincial/Statistical Review of NDA 50. 679/SE1-002. pp 143-147. May 16, 1997, BMS Document Control No. 910063575.

#### **DIZERES LEGAIS**

M.S. nº 1.0370. 0291

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659



Diluente água para injeção em ampola plástica

Produzido e Embalado por:

**ISO FARMA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA**

Rua Manoel Mavignier, 5000, Precabura - Eusébio - CE

CNPJ - 02.281.006/0001-00 - Indústria Brasileira

#### **LABORATÓRIO**

#### **TEUTO BRASILEIRO S/A.**

CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA

CEP 75132-140 – Anápolis – GO

Indústria Brasileira



**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**