

MEMORIOL® B₆ 200

**(glutamina 200 mg, glutamato de cálcio 250 mg,
fosfato de ditetraetilamônio 6 mg, cloridrato de
piridoxina 20 mg)**

Laboratórios Baldacci Ltda.

Comprimido revestido

MEMORIOL® B₆ 200

glutamina
glutamato de cálcio
fosfato de ditetraetilamônio
cloridrato de piridoxina

APRESENTAÇÃO

MEMORIOL® B₆ 200 é apresentado em embalagens com 20 comprimidos revestidos.

VIA ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de **MEMORIOL® B₆ 200** contém:

glutamina	200 mg
glutamato de cálcio	250 mg
fosfato de ditetraetilamônio	6 mg
cloridrato de piridoxina (vitamina B ₆)	20 mg
Excipientes q.s.p.	1 comprimido revestido.

Excipientes: estearato de magnésio, povidona, silicato de magnésio, sacarose, etilcelulose, polietilenoglicol, hipromelose, dióxido de titânio e corante vermelho laca.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é um suplemento vitamínico e mineral destinado ao tratamento de doenças crônicas e convalescença.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

MEMORIOL® B₆ 200 foi elaborado com a finalidade de colocar à disposição dos médicos um suplemento vitamínico e mineral associado com aminoácidos, dotado de ação potenciada, para o tratamento das formas mais acentuadas de astenia neuromuscular, psicastenia e estados amnésicos ou para a prevenção da síndrome de cansaço mental, frequente durante os períodos de intensa ou prolongada atividade cerebral.

Sabe-se que a glutamina exerce uma função de importância fundamental no metabolismo do SNC e pode-se afirmar que a sua presença é indispensável para a reconstituição das proteínas cerebrais, por meio dos processos de reamidação e ressíntese protéica, destinados a compensar o desgaste provocado pela atividade funcional do órgão.

Atravessando a barreira hematoencefálica, a glutamina age estimulando e melhorando a nutrição do SNC, fornecendo aos tecidos o suprimento de aminas indispensáveis à sua recuperação trófica e funcional.

As necessidades de glutamina são maiores nos períodos de intensa ou prolongada atividade intelectual ou nos estados de deficiente desenvolvimento dos tecidos cerebrais e sua carência provoca rapidamente esgotamento nervoso.

O fosfato de ditetraetilamônio aumenta o suprimento de fósforo sob forma orgânica, facilmente assimilável; estimula as funções circulatória e respiratória e, por meio de seu radical tetraetilamônio, reduz as perdas de fósforo, aumentando indiretamente sua utilização por parte do organismo.

O ácido glutâmico (empregado no **MEMORIOL®B₆ 200** sob forma de glutamato de cálcio, por sua maior estabilidade e tolerância gástrica), estimula a hipófise, com efeitos simpaticotônicos, aumenta a secreção gástrica, reforçando as funções digestivas e melhorando a nutrição geral.

A vitamina B6 ativa os processos bioquímicos não oxidativos dos aminoácidos e atua como coaminoferase, promovendo a movimentação dos grupos amínicos para o ácido cetoglutárico e favorecendo a formação do ácido glutâmico.

3. CONTRA-INDICAÇÕES

MEMORIOL®B₆ 200 não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade a quaisquer componentes da fórmula.

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não são conhecidas quaisquer restrições ao uso de **MEMORIOL®B₆ 200** juntamente com alimentos. Preferencialmente, o medicamento deve ser utilizado antes das refeições.

MEMORIOL®B₆ 200 pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de idade.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas até o presente momento.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Este medicamento deve ser armazenado na sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade. Dentro destas condições, o seu prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de **MEMORIOL®B₆ 200** são de cor vermelha e de faces convexas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Via oral. Os comprimidos devem ser ingeridos sem mastigar, com líquido suficiente para engolir. A posologia é de 2 a 4 comprimidos de **MEMORIOL®B₆ 200** ao dia, ou mais, antes das refeições ou a critério médico.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. SUPERDOSE

Não existem relatos de intoxicação por superdosagem de **MEMORIOL®B6 200**. Em caso de administração acima da dose recomendada em bula accidentalmente, orienta-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. Nº 1.0146.0030
Farm. Resp.: Roberto Andrade Milan – CRF-SP nº 8.956



LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA
Rua Pedro de Toledo, 520 - VI. Clementino - São Paulo - SP
CNPJ: 61.150.447/0001-31
Indústria Brasileira

SAC
0800 133 222



“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 04/03/2015”

Anexo B
Histórico de alteração da bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera a bula				Dados das alterações de bula		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens da bula	Versões (VP/ VPS)	Apresentações relacionadas
15/04/2013	0286568/13-8	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	15/04/2013	0286568/13-8	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	15/04/2013	Adequação RDC 47/2009	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.	VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20

12/03/2014	0179120/14-6	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	12/03/2014	0179120/14-6	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	12/03/2014	Alteração da identidade visual da empresa e de Dizeres Legais	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
17/03/2014	0190446/14-9	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	17/03/2014	0190446/14-9	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	17/03/2014	Exclusão da frase: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA , uma vez que não aplica para este medicamento	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
04/03/2015		10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	04/03/2015		10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	04/03/2015	Alteração no item COMPOSIÇÃO e Dizeres Legais	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20