

**Sabofen<sup>®</sup>**

**Geyer Medicamentos S.A.**  
**Sabonete**  
**50 g / 100 g**

# Sabofen®

iodopovidona 7 mg/g



## APRESENTAÇÕES

Sabonete com 7 mg/g de iodopovidona: embalagens com 50 g e 100 g.

## USO EXTERNO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

Cada grama de sabonete contém 0,007 g de iodopovidona.

Excipientes: massa base e essência.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O **Sabofen®** é indicado para a antissepsia da pele e couro cabeludo. O uso deste sabonete é recomendado na limpeza das mãos e ferimentos leves; como auxiliar na prevenção e tratamento de afecções cutâneas (furúnculos, acnes, impetigos, dermatites infecciosas e dermatomicoses superficiais); na higienização do corpo (banho), reduzindo odores fortes provenientes da carga microbiana da pele e como antisséptico da mucosa vaginal.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**Sabofen®** é um produto para uso tópico a base de iodopovidona, um complexo estável que libera gradualmente o iodo, o qual possui efeito ativo contra diversos microrganismos, incluindo bactérias, fungos e vírus causadores de doenças. A ação antisséptica da iodopovidona inicia no instante do contato com a pele.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o **Sabofen®** se você tiver hipersensibilidade (alergia) ao iodo. Em caso de sensibilidade, suspender o uso.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O **Sabofen®** é somente para uso externo. Evite o contato do sabonete com os olhos e no caso de contato acidental, lave-os abundantemente com água corrente; se persistir o desconforto, procure seu médico.

O uso prolongado de **Sabofen®** em gestantes e recém nascidos depende de orientação médica.

Em casos de ferimentos profundos e queimaduras graves, consulte seu médico antes de usar o **Sabofen®**.

A absorção do iodo contido na iodopovidona pode interferir em testes da função tireoidiana.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter o **Sabofen®** em temperatura ambiente (15 a 30° C) e proteger da umidade.

O prazo de validade é de 36 meses a partir da sua data de fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

O **Sabofen®** é um sabonete de cor amarela.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve molhar as mãos ou a área desejada com água limpa e friccionar o **Sabofen®** até formar espuma, espalhando uniformemente a espuma, deixando-a em contato com a pele por algum tempo que pode variar de 30 segundos (degermação leve) a 5 minutos (degermação profunda). Enxágue abundantemente com água corrente.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você pode usar o **Sabofen**<sup>®</sup> logo que se lembrar, sempre que for necessário o uso do sabonete antisséptico.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Raramente o **Sabofen**<sup>®</sup> pode causar reações de hipersensibilidade (alergia) ao iodo, caracterizadas por erupções cutâneas. Se esses sintomas ocorrerem, pare de usar o **Sabofen**<sup>®</sup> e procure seu médico.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

É pouco provável que ocorram problemas no caso de uso de uma grande quantidade de **Sabofen**<sup>®</sup>. Se reações cutâneas forem observadas, procure seu médico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

M.S. 1.0443.0040.002-8 (50 g)

M.S. 1.0443.0040.001-1 (100 g)

Farmacêutica Responsável: Glaucia Porto Prates CRF - RS 4261

**Geyer Medicamentos S.A.**

Rua Pelotas, 320 - Porto Alegre - RS

CNPJ.: 92.670.801/0001-82

Indústria Brasileira

**www.geyermed.com.br**

**SAC: 0800 6040075 - sac@geyermed.com.br**

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



## Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
		10461- Específico – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12					Adequação à RDC 47/2009	VP e VPS	50 g e 100 g