



## **Biofor C**

Laboratório Farmacêutico Vitamed LTDA.

Comprimidos Efervescentes  
(aspartato de arginina 1g + ácido ascórbico 1g)

## Biofor C

Aspartato de arginina 1g\*

Ácido ascórbico 1g

\* Equivalente a 567 mg de arginina base.

## APRESENTAÇÕES

Aspartato de arginina 1g e ácido ascórbico 1g. Embalagem contendo 10 e 16 comprimidos efervescentes.

## USO ORAL

### USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido efervescente contém:

Aspartato de arginina .....1 g

Ácido ascórbico (vitamina C) .....1 g

Excipientes.....qsp.....1 comprimido efervescente

Excipientes: ácido cítrico, aroma sólido de guaraná com açaí, aspartame, bicarbonato de sódio, corante amarelo nº 6, maltodextrina e óleo mineral.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento está indicado: para casos de convalescença; em casos pós-cirúrgico; como cicatrizante; como antioxidante; como auxiliar do sistema imunológico; em dietas restritivas ou inadequadas, onde há deficiência de vitamina C.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Biofor atua no organismo através da associação entre o aspartato de arginina e o ácido ascórbico, auxiliando no restabelecimento físico e nas condições de astenia (fraqueza orgânica), após períodos doenças e de condições pós-cirúrgicas. Possui a função de fortalecer o sistema imunológico e atua como coadjuvante em tratamento de processos gripais e infecciosos.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contraindicações: O produto BIOFOR não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da formulação. Também não deve ser utilizado em pacientes com litíase oxállica e úrica (pedra nos rins) e insuficiência renal.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.** Informe ao médico a ocorrência da gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informar ao seu médico se está amamentando.

**Este medicamento é contraindicado para crianças.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e Advertências: Em pacientes com dietas com restrição de sódio devem considerar que cada comprimido de BIOFOR contém 0,1758 g de sódio por comprimido.

Gravidez: **Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.** Informe ao médico a ocorrência da gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informar ao seu médico se está amamentando.

Idosos: Não constam dados na literatura relatos sobre advertências ou recomendações do uso adequado por pacientes idosos.

**Atenção Fenilcetonúricos: contém fenilalanina.**

Interações medicamentosas: Alguns medicamentos podem diminuir a absorção da vitamina C pelo organismo. Estes medicamentos compreendem os anticoncepcionais orais e corticoesteróides. O ácido acetilsalicílico, os

barbitúricos e a tetraciclina aumentam a eliminação da vitamina C pela urina. A deferoxamina interfere na ação do ferro nos tecidos. Quanto ao aspartato de arginina, até o momento não são conhecidas as possíveis interações com outros medicamentos.

Interações com testes laboratoriais: O ácido ascórbico (vitamina C) pode interferir em alguns exames laboratoriais. Para evitar tal interação, suspenda o uso por uns dias antes da realização destes exames.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

BIOFOR deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e umidade. Manter o produto na embalagem original.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Após aberto, o produto pode ser consumido até o prazo de validade. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original. Contém tampa com agente dessecante. Manter o frasco bem fechado.

BIOFOR comprimido efervescente tem formato arredondado e possui coloração marrom alaranjada e aroma característico de guaraná com açaí.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Dosagem:

Ingerir um comprimido ao dia, preferencialmente no café da manhã. Dissolver o comprimido em meio copo de água e beber imediatamente após o término da diluição, de preferência durante as refeições. O limite máximo de ingestão deste medicamento não deve ultrapassar um comprimido ao dia.

Posologia Diária Recomendada	IDR	% IDR
Ácido ascórbico (Vitamina C)	45 mg	2222,2%
Aspartato de Arginina	*	*

\* IDR não determinada

**Risco de uso por via de administração não recomendada:** Não há estudos dos efeitos de Biofor administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Quando houver esquecimento, tomar uma dose normal no próximo horário, não sendo necessário suprir a dose esquecida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): azia, náuseas, vômitos, diarreia e aumento da diurese (quantidade de urina eliminada pelos rins).

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): litíase oxálica ou úrica, ou seja, formação de cálculos nas vias urinárias por acúmulo de ácidos oxálicos, ácido úrico e uratos.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não existem relatos de intoxicação por superdose de aspartato de arginina e ácido ascórbico. Ocasionalmente, altas doses de ácido ascórbico (3 g ou mais) podem causar leves efeitos diuréticos ou diarréicos. Se houver caso de ingestão proposital ou accidental de grandes quantidades do produto, os principais sintomas que podem ocorrer são: náuseas, vômitos e diarréia. Neste caso, deve-se suspender o uso e procurar imediatamente orientação médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

M.S.: 1.1695.0036

Farm. Resp.: Glauco Fernandes Miranda – CRF/RS 5252

Laboratório Farmacêutico Vitamed Ltda

Rua Flávio Francisco Bellini, 459

Caxias do Sul-RS 95098-170

CNPJ: 29.346.301/0001-53

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (54) 4009-3210

sac@vitamed.com.br

www.vitamed.com.br

**Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**

Lote, data de fabricação e validade: vide rótulo e/ou cartucho.



## Histórico de Alterações da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de Aprovação	Itens de Bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
22.08.2014	Gerado no momento do peticionamento	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22.08.2014	Gerado no momento do peticionamento	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	22.08.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificação do Medicamento</li> <li>- Como este medicamento funciona?</li> <li>- Quando não devousar este medicamento?</li> <li>- O que devo saber antes de usar este medicamento?</li> <li>- Como devo usar este medicamento</li> <li>- Quais os males que este medicamento pode me causar?</li> </ul>	VP VPS	10 comprimidos efervescentes  16 comprimidos efervescentes
22.04.2013	0309530134	10461- ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	22.04.2013	0309530134	10461- ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	22.04.2013	Versão Inicial	VP VPS	10 comprimidos efervescentes  16 comprimidos efervescentes

