

**LACTO-VAGIN<sup>®</sup>**  
tirotricina + ASSOCIAÇÃO

**SOLUÇÃO GINECOLÓGICA**

## **FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

**LACTO-VAGIN® SOLUÇÃO GINECOLÓGICA:** cartucho com frasco contendo 150 mL, acompanhado de copo-medida de 10 mL.

## **USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE**

## **USO GINECOLÓGICO – NÃO INGERIR**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada mL da solução contém:

tirotricina .....	0,25 mg
hidroxiquinolina .....	10 mg
ácido láctico .....	0,04 mL
ácido tântico .....	2 mg
ácido acético .....	0,04 mL
Veículos * q.s.p. ....	1 mL
*( cânfora, edetato dissódico, álcool etílico, essência de alecrim, essência de alfazema, água purificada)	

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

LACTO-VAGIN® é indicado no tratamento de vulvovaginites (inflamação ou infecção da vulva, vagina e epitélio escamoso do colo uterino) e cervicites (irritação do colo do útero) de qualquer tipo ou origem; como preventivo no pré e pós-operatório vaginal; higiene íntima e do pós-parto; no tratamento de candidíase.

### **COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

LACTO-VAGIN® solução ginecológica, é um medicamento utilizado no tratamento de inflamações e infecções vulvovaginais.

Os componentes de LACTO-VAGIN® apresentam atividades antibacteriana, antifúngica e antiinflamatória, restaurando as características normais da vagina e genitais femininos externos.

A tirotricina é um antibacteriano tópico, ativo contra bactérias Gram-positivas, aeróbias e anaeróbias. A hidroxiquinolina possui ação bacteriostática e antifúngica. O ácido tântico age contraindo os tecidos e vasos sanguíneos, diminuindo a produção de secreções. O ácido láctico e acético elevam a acidez do meio vaginal, auxiliando na eliminação dos agentes infecciosos. A cânfora tem atividade antipruriginosa e estimulante da circulação local.

## **QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**LACTO-VAGIN® não deve ser utilizado em casos de alergia a tirotricina ou a qualquer componente da fórmula.**

**Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.**

## **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Advertências e Precauções**

**Gestantes - Risco C:** Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Lactação:** Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres que estão amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

**Interações Medicamentosas:** Devido à ação tópica do medicamento, não são conhecidas interações com LACTO-VAGIN®.

**LACTO-VAGIN® não deve ser ingerido.**

**LACTO-VAGIN® somente deve ser utilizado após a mistura em água, pois seu uso não diluído pode causar irritação local intensa.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Características LACTO-VAGIN<sup>®</sup>: líquido límpido, de cor castanha, com odor característico.

LACTO-VAGIN<sup>®</sup> deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) protegido da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.  
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

## **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Em um recipiente adequado e limpo, adicionar, para cada 1 litro de água morna, 30 mL de LACTO-VAGIN<sup>®</sup> e misturar. A solução pode ser utilizada para a realização de banho de assento ou ducha vaginal.

*Banho de assento:* A paciente deve permanecer em contato com o banho por, no mínimo, 15 minutos, não sendo necessário o enxágüe com água ao término. Após o banho, a água deve ser descartada e nova preparação deve ser feita para a próxima aplicação. Recomenda-se a realização de 2 a 3 banhos de assento externos diários com LACTO-VAGIN<sup>®</sup>. Banhos de assento com LACTO-VAGIN<sup>®</sup> podem ser aplicados durante 4 semanas, no máximo.


*Duchas vaginais:* Devem ser realizadas apenas 1 vez ao dia, durante cinco dias, no máximo.

Se após o período de tratamento recomendado não houver o desaparecimento dos sintomas, o médico deverá ser consultado.

Para a utilização correta das doses de LACTO-VAGIN® recomenda-se o uso do copo-medida contido na embalagem do medicamento.

O copo-medida possui indicações visuais de doses, as quais devem ser seguidas conforme modo de usar.

Descrição do copo-medida:



← **1 Copo-medida de 10 mL**

**Não há estudos dos efeitos de LACTO-VAGIN® administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, o uso deve ser apenas ginecológico.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de esquecimento da utilização do medicamento no horário correto, utilizar assim que possível.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

LACTO-VAGIN® é um medicamento bem tolerado pela grande maioria dos pacientes, a incidência de reações adversas foi determinada com base em estudos e literaturas científicas indexadas.

**Distúrbios do Fígado e da Vesícula biliar:** Hepatite.

**Distúrbios do Sistema Urinário:** Toxicidade para os rins.

**Afecções da Pele e Distúrbios Afins:** Irritação local, Síndrome de Stevens-Johnson, Sensação de queimação no local da aplicação.

**Distúrbio do Estado Geral:** Dor.

**Distúrbio dos Órgãos dos Sentidos:** Perda da sensibilidade de sentir cheiro.

**Distúrbio do Sistema Respiratório:** Irritação nasal, asfixia, inchaço na garganta, inflamação dos pulmões.

**Distúrbio do Sistema Gastrointestinal:** Vômito, hematemese, úlcera estenose pilórica.

**Distúrbio do Sistema Cardiovascular:** Desmaio.

**Distúrbio de Plaquetas, Sangramentos e Coagulação:** Coagulação intravascular.

**Distúrbios das Células Sanguíneas Vermelhas:** Hemólise.

## **DADOS DE FARMACOVIGILÂNCIA**

Ainda não foram relatadas reações adversas com o uso do produto LACTO-VAGIN® durante o período pós-comercialização.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da UCI-Farma pelo telefone 0800 191 291 ou pelo e-mail: [sac@uci-farma.com.br](mailto:sac@uci-farma.com.br).**

**O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Devido à baixa absorção do medicamento quando administrado por via tópica, as concentrações séricas não serão significativas para ocasionar intoxicação.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**Lote, Fabricação e Validade: Vide Cartucho.**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 191 291  
Email: [sac@uci-farma.com.br](mailto:sac@uci-farma.com.br)**

Farmacêutico Responsável: Dr. Claudio Roberto Mataruco  
CRF-SP nº 47.156

LACTO-VAGIN<sup>®</sup>: Registro MS nº 1.0550.0036.001 -2

**UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA**  
Rua do Cruzeiro, 374 – São Bernardo do Campo – SP  
CNPJ 48.396.378/0001-82 – **Indústria Brasileira**

“Esta bula foi aprovada pela ANVISA em xx / xx / xxxx”

