

VITÔNICO[®]

**sulfato ferroso + ácido fosfórico + tintura de babosa (*Aloe humilis*) + tintura de mirra (*Commiphora myrrha*) + tintura de noz moscada (*Myristica fragans*)
+ tintura de cravo da índia (*Eugenia caryophyllata*) + tintura de canela
(*Cinnamomum ceylanicum*)**

LEGRAND PHARMA IND. FARM. LTDA.

Solução oral

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Vitônico®

sulfato ferroso + ácido fosfórico + tintura de babosa (*Aloe humilis*) + tintura de mirra (*Commiphora myrrha*) + tintura de noz moscada (*Myristica fragans*) + tintura de cravo da índia (*Eugenia caryophyllata*) + tintura de canela (*Cinnamomum ceylanicum*).

APRESENTAÇÕES

Solução Oral. Frascos contendo: 250 mL, 350 mL ou 500 mL.

Concentração (vide Composição).

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Composição		IDR * (Calculado a partir da posologia diária máxima)			
		Adulto – posologia diária de 60 ml	Crianças 1-3 anos (12 a 36 meses) - posologia diária de 30 ml	Crianças 4-6 anos (37 meses a 6 anos) - posologia diária de 30 ml	Crianças de 7-10 anos - posologia diária de 30 ml
Sulfato ferroso	0,1466 mg	13,00 %	15,00 %	15,00 %	10,00 %
Ácido fosfórico	4,0 mg	10,85 %	8,25 %	7,59 %	3,04 %
Tintura de <i>Aloe humilis</i> (babosa)	0,0008 ml	-	-	-	-
Tintura de <i>Commiphora myrrha</i> (mirra)	0,0001 ml	-	-	-	-
Tintura de <i>Myristica fragans</i> (noz moscada)	0,02 ml	-	-	-	-
Tintura de <i>Eugenia caryophyllata</i> (cravo da índia)	0,008 ml	-	-	-	-
Tintura de <i>Cinnamomum ceylanicum</i> (canela)	0,01 ml	-	-	-	-
Veículo** q.s.p	1 ml				

*Ingestão Diária Recomendada

** metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sorbitol, mentol, corante caramelo e água purificada.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Vitônico® é indicado como estimulante do apetite e nos estados de inapetência (perda da vontade de se alimentar).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Vitônico® é um revigorante à base de ferro e fósforo que atua no metabolismo, sendo indicado no tratamento dos sintomas de desgaste físico e mental, da anemia e convalescência.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado nos casos de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula e nos casos de tuberculose pulmonar e hipertensão (pressão alta).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Existem relatos de distúrbios gastrintestinais (náuseas, vômito e diarréia) devido ao uso de Vitônico®. Deve ser mantido um controle na administração a crianças.

Pacientes idosos: Não constam na literatura relatos sobre advertência ou recomendações especiais do uso adequado por pacientes idosos.

Gravidez e lactação: Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao médico se está amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações medicamentosas: A ingestão concomitante de medicamentos que contenham ferro com antiácidos e tetraciclina oral pode alterar a absorção do sulfato ferroso.

Por causar hipoglicemias, a mirra pode interferir na terapia anti-diabética. Por isso, pacientes com diabetes devem ser monitorados.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

Solução límpida, na cor castanha escuro, com sabor e odor característico, isenta de partículas e impurezas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Vitônico® deve ser administrado por via oral e antes das principais refeições (almoço e jantar).

Posologia:

Adulto: 2 colheres de sopa (30 mL).

Crianças: 1 colher de sopa (15 mL).

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Tome a dose assim que se lembrar dela. Entretanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, salte a dose esquecida e continue o tratamento conforme prescrito ou posologia desta bula. Não utilize o dobro da dose para compensar uma dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

O uso deste medicamento pode causar diarréia, dores abdominais e náuseas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem, suspenda o uso e procure assistência médica. Com a superdosagem, podem surgir diarréia, dores abdominais e náuseas.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

Reg. MS nº 1.6773.0247

Farm. Resp. Dra. Maria Betânia Pereira
CRF – SP nº. 37.788

Registrador por: LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

Rod. Jornalista F. A. Proenca, km 08
Bairro Chácara Assay
CEP 13186-901 - Hortolandia/SP
CNPJ: 05.044.984/0001-26
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricado por: EMS S/A
Hortolândia – SP

SAC: 0800-500600
www.legrandpharma.com.br

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica



Histórico de alteração para a bula

Número do expediente	Nome do assunto	Data da notificação/petição	Data de aprovação da petição	Itens alterados
N/A	(10461) Medicamento Específico - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	18/07/2013	18/07/2013	Submissão eletrônica apenas para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.