

# **Sadol**

**Laboratório Catarinense S/A**

**Solução oral**

**Sadol: Sacarato de óxido férrico  
0,4mL/mL**

**Sadol sabor Chocolate: Sacarato de  
óxido férrico 0,4 mL/mL**

**Sadol sabor Morango: Sacarato de óxido  
férrico 0,4 mL/mL**

# SADOL®

sacarato de óxido férrico

**Forma farmacêutica e apresentação:**

Solução oral - frasco plástico transparente âmbar x 400ml.

**VIA ORAL**

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**Contém 400ml.**

**COMPOSIÇÃO:**

**Sadol®:**

Cada ml de produto contém 0,4ml de sacarato de óxido férrico [equivalente a 2mg de ferro], e excipientes [propilenoglicol, citrato de sódio, aroma de cacau, metilparabeno, ácido clorídrico, ácido cítrico, propilparabeno e água purificada].

**Sadol® Chocolate:**

Cada ml de produto contém 0,4ml de sacarato de óxido férrico [equivalente a 2mg de ferro], e excipientes [propilenoglicol, citrato de sódio, aroma de chocolate, metilparabeno, aroma de baunilha, ácido clorídrico, ácido cítrico, propilparabeno e água purificada].

**Sadol® Morango:**

Cada ml de produto contém 0,4ml de sacarato de óxido férrico [equivalente a 2mg de ferro], e excipientes [propilenoglicol, citrato de sódio, metilparabeno, aroma de morango, ácido clorídrico, ácido cítrico, propilparabeno e água purificada].

1ml equivale a 20 gotas. 1 gota contém 0,1mg de ferro.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Sadol® é destinado ao tratamento das anemias ferroprivas e hipocrônicas (anemias causadas pela deficiência de ferro e pela diminuição na proporção do peso da proteína que carrega o ferro com relação ao volume da célula vermelha, respectivamente).

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

A deficiência de ferro é, sem dúvida, a carência nutricional mais comum e a causa mais freqüente de anemia no mundo. A única forma de tratamento para esse tipo de anemia é a reposição de ferro para o organismo. Sadol® é uma excelente fonte de ferro. Por isso, é utilizado para o tratamento das anemias causadas por deficiência de ferro. O efeito antianêmico começa a aparecer depois de cerca de 1 semana de tratamento com o produto.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Sadol® não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade conhecida à droga ou a seus componentes.

**Não há contra-indicação relativa à faixa etária.**

**Este medicamento é contra-indicado para uso por diabéticos.**

**Este medicamento é contra-indicado para uso por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista [Categoria C].**

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Atenção diabéticos : este medicamento contém SACAROSE.**

**Interações medicamentosas**

■ Compostos contendo cálcio e magnésio incluindo anti-ácidos e suplementos minerais, bicarbonatos, carbonatos, oxalatos ou fosfatos podem prejudicar a absorção do ferro pela formação

de complexos insolúveis.

■ Sais de zinco podem interferir na absorção de ferro.

■ Alguns agentes, como o ácido ascórbico e o ácido cítrico podem aumentar a absorção de ferro.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Sadol® deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15 a 30 °C].

O produto Sadol® apresenta validade de 24 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Após a abertura da embalagem, o produto deve ser guardado adequadamente para se manter próprio ao consumo dentro do prazo de validade.**

O produto Sadol® apresenta-se como um líquido móvel e límpido, de cor pardo avermelhado escuro e com odor aromático, característico. O sabor é doce e picante.

O produto Sadol® Chocolate apresenta-se como um líquido móvel e límpido, de cor pardo avermelhado escuro e com odor aromático, característico de chocolate. O sabor é doce, característico de chocolate.

O produto Sadol® Morango apresenta-se como um líquido móvel e límpido, de cor pardo avermelhado escuro e com odor aromático, característico de morango. O sabor é doce, característico de morango.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.**

**A solução oral deve ser ingerida por via oral.**

A posologia foi estabelecida da seguinte maneira:

Crianças até 6 anos: 1 colher de chá (5ml), 2 vezes ao dia, antes das principais refeições, por via oral, que corresponde à 333% da IDR.

Crianças acima de 6 anos: 1 colher de sobremesa (10ml), 2 vezes ao dia, antes das principais refeições, por via oral, que corresponde à 444% da IDR.

Adultos: 1 colher de sopa (15ml), 2 vezes ao dia, antes das principais refeições, por via oral, que corresponde à 428% da IDR.

A posologia em ml por peso corpóreo deve ser calculada com base no produto para cada faixa etária, conforme segue: crianças até 12 anos: 0,5ml/kg/dia; adultos: 0,43ml/kg/dia.

A dose diária máxima deste medicamento deverá ser conforme segue: para crianças até 6 anos: 2 colheres de chá (10ml), dividida em 2 doses; para crianças acima de 6 anos: 2 colheres de sobremesa (20ml), dividida em 2 doses; para adultos: 2 colheres de sopa (30ml), dividida em 2 doses.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você esqueça de tomar uma dose do produto Sadol®, pode tomar a dose esquecida naquele horário, e tomar a próxima dose, no horário correto, respeitando o intervalo normal.

Nunca tome uma dose dobrada para compensar a dose perdida.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam o produto): podem ocorrer azia, náusea, desconforto na parte inferior do abdome, constipação e diarréia.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não foram relatados casos de superdosagem até o momento com o produto Sadol®.

Se ocorrer ingestão accidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**



Sadol® M.S. 1.0066.0052.004-2  
Sadol® Chocolate M.S. 1.0066.0052.006-9  
Sadol® Morango M.S. 1.0066.0052.005-0  
Farm. Resp.: Carlos E. de Carvalho  
CRF-SC Nº 4366  
Laboratório Catarinense S.A.  
Rua Dr. João Colin, 1053  
89204-001 - Joinville - SC  
CNPJ 84.684.620/0001-87  
Indústria Brasileira  
© SAC 0800-474222  
www.labcat.com.br



® = marca registrada do Laboratório Catarinense S.A.

Cód.: 150781(p) Rev.: 05/2013