



NUTRIMAIZ SM[®]
(polivitamínico + polimineral + poliamioácido)

União Química Farmacêutica Nacional S.A

Cápsula

NUTRIMAIZ SM[®]

polivitamínico + polimineral + poliaminoácido

Cápsula



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Cápsula: embalagem contendo 24 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

COMPOSIÇÃO:

Cada cápsula contém:

ácido glutâmico.....	50,00 mg
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)	1,25 mg
cianocobalamina (vitamina B12)*	7,50 mcg
cloridrato de carnitina.....	75,00 mg
nicotinamida.....	10,00 mg
riboflavina (vitamina B2)	1,25 mg
nitrito de tiamina (vitamina B1)	4,00 mg
sulfato ferroso revestido 60%.....	16,667 mg**

Outros componentes: sulfato de magnésio monohidratado e fosfato de cálcio dibásico di-hidratado

Excipientes: talco, celulose microcristalina e dióxido de silício.

* Na forma de cianocobalamina 0,1%

** Equivalente a 10 mg de sulfato ferroso

	% da IDR* por faixa etária / dose diária recomendada		
	Adulto	Gestante	Lactante
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)	384,62	263,16	250,00
cianocobalamina (vitamina B12)	1.250,00	1.153,84	1.071,43
nicotinamida	250,00	222,22	235,29
riboflavina (vitamina B2)	384,62	357,14	312,50
nitrito de tiamina (vitamina B1)	1.333,30	1.142,86	1.066,67
ferro	105,03	54,46	98,03

* Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico e mineral utilizado em dietas restritivas e inadequadas. É um suplemento de vitaminas do complexo B e ferro.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico do complexo B em associação com sal de ferro, carnitina e ácido glutâmico. As vitaminas do complexo B participam de sistemas enzimáticos (sistemas do corpo que participam de reações químicas), regulando várias fases de metabolismo dos glicídeos (moléculas como o açúcar), dos lipídeos (gorduras) e das proteínas.

A carnitina é necessária para o metabolismo energético e o ácido glutâmico é importante no metabolismo celular.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gravidez

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o término.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Este medicamento pode ser administrado durante a lactação sob orientação médica. Informe ao seu médico se esta amamentando.

Pediatria

Este medicamento não pode ser administrado em crianças menores de 12 anos.

Interações medicamentosas

Os antiácidos, o sucralfato e os óleos minerais diminuem a absorção das vitaminas.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Os antiácidos diminuem a absorção das vitaminas.

Interferência em exames laboratoriais

Não são conhecidos dados sobre interferência em exames laboratoriais.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C); proteger da umidade.

O prazo de validade é 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: cápsula de gelatina com corpo branco e tampa vermelha, contendo pó amarelado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Adultos e adolescentes

Tomar 2 cápsulas de NUTRIMAIZ SM por via oral duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, ou de acordo com prescrição médica.

Não ultrapassar a dose diária máxima de 8 cápsulas.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer-se de tomar uma dose, tome tão logo você se lembre. Se estiver quase na hora da dose seguinte, pule a dose que você perdeu e volte a tomar no seu horário habitual. Nunca tome 2 doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

NUTRIMAIZ SM pode, raramente, provocar náuseas (enjoo), diarreias, vômitos e dor de cabeça.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Na eventualidade da ingestão acidental ou administração de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Registro MS – 1.0497.1147

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-000
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas
CRF-SP: 49136

Fabricado na unidade fabril:
Trecho 01, Conjunto 11 Lote 6/12
Polo de Desenvolvimento JK
Brasília – DF – CEP: 72549-555
CNPJ: 60.665.981/0007-03
Indústria Brasileira

SAC 0800 11 1559





NUTRIMAIZ SM[®]
(polivitamínico + polimineral + poliamioácido)

União Química Farmacêutica Nacional S.A

Suspensão oral

NUTRIMAIZ SM®

polivitamínico + polimineral + poliaminoácido

Suspensão oral



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Suspensão oral: embalagem contendo frasco de 90 mL + copo medida.

Suspensão oral: embalagem contendo frasco de 90 mL.

USO ORAL

USO PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada 5 mL contém:

ácido glutâmico.....	100,00 mg
cloridrato de piridoxina (Vitamina B6).....	2,50 mg
cloridrato de tiamina (Vitamina B1).....	5,00 mg
cianocobalamina (Vitamina B12).....	15,00 mcg
cloridrato de carnitina.....	100,00 mg
nicotinamida.....	20,00 mg
fosfato sódico de riboflavina (Vitamina B2).....	1,71 mg*
citrato férrico amoniacal.....	50,00 mg
cloreto de magnésio hexaidratado.....	169,00 mg

*Equivalente a 1,25 mg de riboflavina base

Outros componentes: fosfato de cálcio dibásico di-hidratado

Veículo: propilenoglicol, aroma de *toffe* coco, laurilsulfato de sódio, crospovidona, corante de caramelo tipo C, sucralose, metilparabeno, dióxido de silício, propilparabeno e sorbitol.

	% da IDR* por faixa etária / dose diária recomendada		
	Crianças – Idade (anos)		
	1 - 3	4 - 6	7 - 10
cloridrato de piridoxina (vitamina B6)	500,00	500,00	500,00
cloridrato de tiamina (vitamina B1)	1.000,00	833,33	1.111,11
cianocobalamina (vitamina B12)	1.666,67	1.250,00	1.666,67
nicotinamida	333,33	250,00	333,33
riboflavina (vitamina B2)	250,00	208,33	277,78
ferro	175,62	175,62	234,16
magnésio	33,66	27,67	40,39

* Ingestão Diária Recomendada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico e mineral utilizado em dietas restritivas e inadequadas. É um suplemento de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

NUTRIMAIZ SM é um suplemento vitamínico do complexo B em associação com sais de ferro e magnésio, carnitina e ácido glutâmico. As vitaminas do complexo B participam de sistemas enzimáticos (sistemas do corpo que participam de reações químicas), regulando várias fases de metabolismo dos glicídeos (moléculas como o açúcar), dos lipídeos (gorduras) e das proteínas.

O magnésio é necessário para numerosos sistemas metabólicos e enzimáticos, transferência de fosfatos, contração e relaxamento muscular e condução nervosa.

A carnitina é necessária para o metabolismo energético e o ácido glutâmico é importante no metabolismo celular.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gravidez

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Este medicamento pode ser administrado durante a lactação sob orientação médica. Informe ao médico se está amamentando.

Pediatria

Este medicamento pode ser administrado em crianças menores de 1 ano somente sob orientação médica.

Interações medicamentosas

Os antiácidos, o sucralfato e os óleos minerais diminuem a absorção das vitaminas.

Ingestão concomitante com outras substâncias

Os antiácidos diminuem a absorção das vitaminas.

Interferência em exames laboratoriais

Não são conhecidos dados sobre interferência em exames laboratoriais.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C).

O prazo de validade é 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: suspensão viscosa, marrom, aroma de *toffe-coco* / caramelo.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Agite a suspensão oral antes de usar.

Crianças de 1 a 6 anos

Tomar 2,5 mL duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, ou de acordo com prescrição médica.

Não ultrapassar a dose máxima diária de 10 mL.

Crianças de 7 a 12 anos

Tomar 5 mL duas vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições, ou de acordo com prescrição médica.

Não ultrapassar a dose máxima diária de 15 mL.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer-se de tomar uma dose, tome tão logo você se lembre. Se estiver quase na hora da dose seguinte, pule a dose que você perdeu e volte a tomar no seu horário habitual. Nunca tome 2 doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

NUTRIMAIZ SM pode, raramente, provocar náuseas (enjoo), diarreias, vômitos e dor de cabeça.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Na eventualidade da ingestão acidental ou administração de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar as medidas habituais de controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Registro MS – 1.0497.1147

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-000
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas
CRF-SP: 49136

Fabricado na unidade fabril:
Trecho 01, Conjunto 11 Lote 6/12
Polo de Desenvolvimento JK
Brasília – DF – CEP: 72549-555
CNPJ: 60.665.981/0007-03
Indústria Brasileira

SAC 0800 11 1559



