

**IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA**  
**IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO**  
**ESTADO DE GOIÁS S.A.**

**Emulsão tópica**  
**250 mg/mL**

## **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

### **IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA**

benzoato de benzila

### **APRESENTAÇÃO**

Emulsão tópica 250 mg/mL, frasco com 100 mL.

## **USO TÓPICO - USO ADULTO e PEDIÁTRICO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada mL de IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA emulsão tópica contém:

benzoato de benzila ..... 250 mg

excipientes q.s.p..... 1 mL

(ácido esteárico, trietanolamina (trolamina) e água purificada).

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA é um medicamento à base de benzoato de benzila, utilizado no tratamento dos piolhos, lêndeas e da sarna.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O benzoato de benzila presente na emulsão tópica e juntamente com a trolamina garante perfeita penetração na pele facilitando a retirada dos parasitas. Seu efeito é rápido e seguro, fazendo com que desapareçam prontamente todos os sintomas, inclusive a coceira, permitindo a cura com um único tratamento.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você não deve usar IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA caso tenha alergia conhecida ao benzoato de benzila ou aos outros componentes do produto.

Não aplicar o produto na pele com feridas e queimaduras.

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA destina-se ao uso externo e não deve ser ingerido nunca, pois poderá ocorrer intoxicação.

IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA não deve ser aplicado no rosto, olhos e mucosas, nem em locais da pele onde haja feridas. Caso isso ocorra, lavar com água abundantemente.

O produto deve ser utilizado com cuidado em pessoas que já apresentaram alergias a outros produtos de aplicação na pele.

IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA pode irritar a pele e mucosas, não sendo recomendado o uso de outras substâncias que também possam irritar a pele.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevantes.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA emulsão tópica** de cor branca leitosa, odor característico, isenta de partículas estranhas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

IQUEGO-BENZOATO DE BENZILA pode ser utilizado no tratamento de piolhos, lêndeas e da sarna por adultos e crianças.

Para crianças até dois anos, aconselha-se dissolver o produto na proporção de uma parte do produto para duas partes de água.

Crianças maiores que 2 anos e menores de 12 anos, aconselha-se dissolver uma parte do produto para uma de água. Esta orientação é para reduzir o risco de irritação. Para adultos, não é necessário dissolver. Não é necessário utilizar todo o volume em uma única aplicação. Além disso, aconselha-se a fazer uma prova de toque (passar o medicamento) em uma pequena área antes de utilizar o produto. Caso ocorra ardência ou vermelhidão, o produto não deve ser usado.

**Tratamento de piolhos e lêndeas:** após lavar os cabelos, esfregar o produto sobre as regiões afetadas.

Aplicar somente o suficiente para umedecer (molhar levemente) o cabelo. Envolver a cabeça com toalha e deixar agir por aproximadamente 3 minutos. Os piolhos mortos e as lêndeas devem ser retirados com um pente fino. Se necessário, a aplicação deve ser repetida. Normalmente o tratamento só deve durar dois dias, pois várias aplicações do produto podem passar a ter papel irritante e aumentar o número das lesões, ao invés de curativo.

**Tratamento da sarna:** fazer uma aplicação, de preferência à noite, após o banho (banhos quentes são contraindicados). O produto deve ser aplicado sobre a pele ainda úmida, especialmente nos locais onde a sarna é mais comum como entre os dedos, axilas (debaixo do braço), barriga e nádegas. Deixar secar, realizar em seguida uma nova aplicação e vestir-se ou deitar-se, sem enxugar o corpo. Na manhã seguinte, tomar novo banho e mudar as roupas do corpo e da cama, que devem ser lavadas e passadas em seguida. Se necessário, o tratamento deve ser repetido após 24 horas, ou a critério médico.

Caso você utilize este medicamento por uma via não recomendada, poderá não obter o efeito desejado e ainda poderão ocorrer reações desagradáveis.

O limite máximo diário de uso é de uma aplicação por dia.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Agite antes de usar.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Retomar o tratamento conforme orientação médica.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico, de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Existem casos de aparecimento de irritação da pele e bolhas na pele no local da aplicação do benzoato de benzila durante o tratamento de sarna.

Pode ocorrer irritação dos olhos após o uso do benzoato de benzila.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### **DIZERES LEGAIS**

MS - 1.0884.0364

Farmacêutico Responsável:  
Dr. Daniel Jesus de Paula CRF-GO nº 3319  
ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA SAÚDE  
IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A.  
Av. Anhanguera, 9.827-Bairro Ipiranga - GOIÂNIA-GOIÁS  
Cx. Postal: 15.102 - CEP.: 74.450-010  
CNPJ Nº 01.541.283/0001-41  
Indústria Brasileira

**Uso sob prescrição médica.  
Venda proibida ao comércio.**

A-0800622829



**Anexo B**  
**Histórico de alteração para a Bula**

Dados da Submissão Eletrônica			Dados da Petição/notificação que altera a bula				Dados das Alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do Expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do Expediente	Assunto	Data da Aprovação	Itens da bula	Versões VP/VPS	Apresentações relacionadas
		Inclusão inicial texto de bula adequada à bula padrão-Bulário Eletrônico ANVISA	-	-	-	-	-	VP/VPS	Emulsão tópica.